

153566

# 中草药单方驗方汇编

(第一册)

驻浙江医科大学工宣队  
浙江医科大学革委会 教改组编

# 說 明

在伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针指引下，我校广大革命师生员工，在驻校工宣队、校革委会领导下，遵照毛主席“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的教导，掀起了一个中草药防治疾病的群众运动，初步积累了一些经验。

本册选择了我校各单位、农村医疗队、试点班和有关兄弟单位用中草药防治疾病确有疗效或有苗头的部分单方、验方209张，计119种病，以期交流经验，进一步促进我校推广中草药的群众运动。

本册处方剂量，按中医习惯一斤十六两计。除说明儿科疾病外，其他疾病处方均为成人用量。所列中草药系指干品（必须用鲜品者，另有注明）。

随着我校中草药群众运动的发展，在总结经验的基础上，我们打算陆续整理出版。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，缺点错误一定很多，请同志们审查、指正。

驻浙江医科大学工宣大队 教改组  
浙江医科大学革委会

# 目 录

## 一、内 科

感冒	( 1 )
流感	( 1 )
流行性脑脊髓膜炎	( 2 )
急性肝炎	( 2 )
慢性肝炎	( 4 )
细菌性痢疾	( 4 )
阿米巴痢疾	( 5 )
肺结核咯血	( 6 )
血吸虫病	( 6 )
丝虫病	( 9 )
疟疾	( 9 )
支气管炎	( 10 )
哮喘	( 11 )

支气管扩张	( 12 )
大叶性肺炎	( 13 )
肺脓疡	( 13 )
溃疡病	( 14 )
溃疡病出血	( 15 )
胃神经痛	( 15 )
风湿性关节炎	( 15 )
高血压病	( 17 )
急性肾炎	( 17 )
慢性肾炎	( 17 )
急慢性尿路感染	( 18 )
急性肾盂肾炎	( 19 )
尿路结石	( 19 )
尿潴留	( 20 )
血小板减少性紫癜	( 20 )
白血球减少	( 20 )
癫痫	( 21 )
甲状腺机能亢进	( 21 )
失眠	( 22 )

## 二、外 科

止血·····	( 23 )
烧伤·····	( 24 )
断指再植·····	( 25 )
骨折·····	( 26 )
跌打损伤·····	( 28 )
破伤风·····	( 30 )
抗菌消炎·····	( 30 )
外用麻醉·····	( 32 )
疖·····	( 33 )
疖病 ( 多发性肿疖 ) ·····	( 33 )
脓肿·····	( 34 )
乳腺炎·····	( 35 )
下肢溃疡·····	( 36 )
骨髓炎·····	( 37 )
淋巴结结核·····	( 38 )

急性兰尾炎·····	( 39 )
兰尾脓肿·····	( 39 )
胆道蛔虫病·····	( 40 )
胆囊炎、胆石症·····	( 41 )
蛔虫性肠梗阻·····	( 43 )
急性胰腺炎·····	( 44 )
肠粘连·····	( 45 )
痔疮·····	( 45 )
肺癌·····	( 47 )
乳癌·····	( 48 )
肝癌·····	( 49 )
胃癌·····	( 49 )
食道下端、胃贲门部癌·····	( 50 )
脑肿瘤·····	( 50 )
腹腔恶性肿瘤·····	( 51 )
绒毛膜上皮细胞癌·····	( 51 )
各种癌症·····	( 52 )
毒蛇咬伤·····	( 52 )
闭塞性脉管炎·····	( 53 )

湿疹	( 53 )
荨麻疹 ( 风疹块 )	( 54 )
手癣	( 54 )
体癣	( 54 )
脓疱疮 ( 又名黄水疮 )	( 54 )
带状疱疹	( 55 )
白癣风	( 55 )
斑秃	( 55 )

### 三、妇 科

月经不调	( 56 )
闭经	( 56 )
白带	( 56 )
盆腔炎、附件炎	( 57 )
宫颈糜烂	( 57 )
滴虫性阴道炎	( 58 )
宫外孕	( 59 )
妊娠中毒症	( 60 )

催产.....	( 60 )
引产.....	( 60 )
通乳.....	( 61 )
回乳.....	( 61 )

## 四、儿 科

麻疹.....	( 62 )
流行性腮腺炎.....	( 62 )
百日咳.....	( 63 )
白喉.....	( 64 )
小儿肺炎.....	( 64 )
小儿口腔炎.....	( 65 )
小儿惊风.....	( 66 )
小儿消化不良.....	( 66 )
小儿疝气.....	( 67 )

## 五、五 官 科

麦粒肿.....	( 68 )
----------	--------



结膜炎·····	( 68 )
角膜炎·····	( 69 )
角膜溃疡·····	( 69 )
玻璃体混浊·····	( 69 )
夜盲·····	( 70 )
急慢性中耳炎·····	( 70 )
耳鸣、听力减退·····	( 70 )
鼻炎、副鼻窦炎·····	( 71 )
鼻息肉·····	( 71 )
扁桃体炎·····	( 71 )
慢性咽喉炎·····	( 72 )
蛀牙痛·····	( 72 )
神经性牙痛·····	( 72 )

## 附录:

### 一、中草药的制剂

汤剂·····	( 73 )
煎剂·····	( 74 )
散剂·····	( 74 )

丸剂	( 74 )
膏剂	( 75 )
丹剂	( 76 )
糖浆剂	( 76 )
酒剂	( 77 )
胶剂	( 77 )
片剂	( 77 )
注射剂	( 77 )

## 二、注射用水

蒸馏法制注射用水	( 80 )
用离子交换树脂精制水	( 82 )
用煮沸水作肌肉注射用水	( 89 )
注射用水的容器	( 90 )

# 内 科

## 感 冒

- 方** 1 野菊花一斤，桑叶一斤半，枇杷叶一斤（去毛）。
- 用法** 水煎代茶。
- 附注** 可作100人预防用。
- 方** 2 板兰根五钱，羌活三钱。
- 用法** 水煎服。
- 疗效** 体温在39°C以上者，基本上一剂可退烧。

## 流 感

- 方** 1 板兰根六钱。
- 用法** 水煎、连服三天为一疗程。
- 附注** 作预防用。
- 方** 2 贯众二斤半，金银花二两，甘草一两，

黄芩四两。

- 用法 水煎代茶。  
附注 可作100人预防用。  
方 3 大青叶一两。  
用法 水煎服。  
疗效 曾治小儿上感及流感95例，平均17小时退烧。

## 流行性脑膜炎

- 方 1 贯众五斤，板兰根三斤。  
用法 浓煎，代茶饮，供100人预防用。  
方 2 桉叶（鲜）二斤，水四斤。  
用法 水煎至二斤，成人每次服50毫升，一日二次，连服三日，隔一日再服，九日为一疗程。

## 急性肝炎

- 方 1 ①平地木一两，紫参五钱，茜草五钱，板兰根五钱。

②青黛一分半，白矾三分。

用法 ①用水煎服。每日一剂。同时吞服②，每日三次，每次一分半。

疗效 曾治5例，降低S、G、P、T（谷丙转氨酶）效佳。

项某，男，成人。检查S、G、P、T 258单位。服此方五剂，S、G、P、T降至38单位，自觉症状有明显好转。

附注 如伴有黄疸，可加茵陈一两。

方 2 紫参二两，糯稻草一两。

用法 将上药混合加水800毫升，浸泡15分钟后煎煮，煮开半小时，将药液倾出。再加水500毫升煎煮第二次，沸后半小时倾出去渣。然后将两次倾出液合并，加白糖五钱，浓缩为200毫升，每日二次，每次服100毫升。

疗效 曾治50例，治愈率100%。

附注 曾治慢性肝炎50例，治愈率78.8%。

方 3 盐肤木根皮五钱，黄梔子根五钱。

**用法** 水煎服，每日一剂，服至黄疸消退为止。

**疗效** 曾治18例，其中16例症状消失，肝功能恢复正常，平均疗程为9.5天，短者8天，长者20天。

## 慢性肝炎

**方 1** 丹参一两，茅根一两，板兰根一两。

**用法** 水煎服，每日一剂，分三次服。

**方 2** 黄毛耳草二两，六月雪一两。

**用法** 水煎服。

**疗效** 曾有一患者，S、G、P、T 200单位以上持续二年余，服药三星期后恢复正常。

## 细菌性痢疾

**方 1** 铁苋菜五钱，马齿苋五钱，地锦草五钱，凤尾草五钱。

**用法** 水煎服。也可任选一种煎服，用量为1—2两。

**附注** 肠炎也可选用。

**方 2** 水杨梅花球。

**用法** 水煎服。每日3—4次，每次五分至1钱，7至14天为一疗程。

**附注** 治疗112例，其中106例痊愈，临床治愈率96.5%。大便化验转阴性平均6.75天；大便次数转正常平均3.1天，

## 阿米巴痢疾

**方 1** 地榆五钱，翻白草一两，白头翁三钱。

**用法** 水煎服。

**方 2** 鸦胆子200粒。

**用法** 将鸦胆子打碎，加水1500毫升，水煎去渣，制成500毫升煎液，每次用50至100毫升保留灌肠。轻者每天一次，重者二次。

## 肺結核咯血

**处 方** 仙鹤草六钱，侧柏叶六钱，大蓟四钱，紫珠草五钱。

**用 法** 水煎服。

## 血 吸 虫 病

**方 1** 枫杨叶半斤。

**用 法** 1 法：鲜枫杨叶半斤切碎，加水一斤，煮开后继续煮10至15分钟即可。一天分三次服完。暂定20天至一个月为一疗程。

2 法：将鲜枫杨叶连同嫩枝摘下，洗净后在温水中捞几分钟，取出晒干备用。每人每天用干树叶2至5两，水煎分二次服。疗程同1法。

3 法：用2法所制的干叶，每次一把，开水泡，当茶喝，经常服用。



**附注** 以上三法可根据具体情况选用一种。  
贺某，男，入院前有腹痛、便血等症状，粪检发现血吸虫卵。用鲜枫杨叶（1法）治疗七天后，症状全部消失，饮食增加，大便四次沉淀集卵检查，均未发现血吸虫卵。

**方 2** 半边莲四两八钱。  
**用法** 加水五斤，煎二小时，用纱布过滤，使成为一斤药液。成人每次服10毫升到60毫升，日服四次。服药一个月为一疗程。

**附注** 治疗晚期血吸虫病。

**方 3** 京大戟。  
**用法** 取京大戟根晒干碾粉。成人每日于早饭后一小时吞服三分，连服三日，以后隔日服一次，共服四至五次（共三钱）为一疗程。同时每日在肿大的肝、脾处用艾温灸三十分钟，有助肝、脾缩小。

**附 注** 可治疗晚期血吸虫病。服用本草药，有恶心、呕吐、腹痛等反应，但不甚严重。在服药期间禁忌食盐。

治疗血防病人药物反应症的中草药处方：

**方 1** 安神汤：柏子仁二钱，远子一钱五分，川芎一钱五分。辅以茅草根一两，甘草一钱五分。加米糠汁煎汤而成。

**方 2** 消化汤：山楂二钱，麦芽二钱，谷芽二钱，甘草一钱五分，茅草根一两。煎汤而成。

**方 3** 止咳汤：枇杷叶三钱，桔梗三钱，冬桑叶一钱，紫苏梗一钱，陈皮一钱，甘草一钱五分。煎汤而成。

**附 注** 治疗血吸虫病服药后，有时会引起神经系统、消化系统的药物反应。应用以上三方对症治疗有良好效果。对集中治疗和重点防治的病人可普遍服用安神汤，一天二至三次，每次五十

毫升。对送药上门治疗的病人，有中度或较重反应时，亦可以同样方法服用安神汤。消化道和呼吸道出现阳性体征时，服用消化汤和止咳汤，每日二至三次，每次五十至一百毫升。

## 絲 虫 病

- 处 方** 刘寄奴（鲜用四两，干用二两）。
- 用 法** 切碎加水十二两煎三小时滤汁，早晚分二次服，十天为一疗程。
- 附 注** 用于象皮肿。

## 瘧 疾

- 方 1** 爵床一两至二两或鲜草三两。
- 用 法** 水煎，在发作前3至4小时服下，即可制止发作。
- 方 2** 桃树叶
- 用 法** 在清晨采摘挑树枝头七只，每只七片

小叶，水煮沸后停火五分钟，再煮开即可。在发作前四小时或清晨一次服下，服药后需休息半小时。

**附注** 曾治疟疾病人四十余例，均一次根治。

**方 3** 毛艮。

**用法** 采鲜毛艮全草搓细如黄豆大二粒，在发作前六小时外敷“经渠”穴和“大椎”穴。待皮肤发红时去药（约2—4小时），随后起泡，用纱布包扎。

## 支 气 管 炎

**方 1** 云雾草二钱至三钱，冰糖或蜜糖五钱。

**用法** 水煎服。二汁可不加糖。一日二次，连服三至四天。

**附注** 咯痰不畅可加天竹子四钱，黄荆子四钱，空沙参五钱同煎则效果更佳。

忌食鱼腥。有咯血者不应服用。

方 2 鲜萝卜汁八两，白糖一两。  
用 法 一次煎服。

## 哮 喘

方 1 酢酱草（鲜一两至三两，干一钱至三钱）。

用 法 水煎服。

疗 效 王某，女33岁。自61年起患哮喘病，发时喘息，不能平卧，经服氨茶硷等药可暂时缓介，但不久即发。65年8月服用酢酱草（干草）三钱，连服三次即愈，到66年春季随访时未见复发。

方 2 毛艮。

用 法 毛艮鲜叶适量捣烂敷大椎穴，外用胶布固定。2—4小时皮肤起泡后去药，用消毒针头刺破小泡，挤出黄色液体，外用消毒纱布包扎。

**疗 效** 曾治疗60例哮喘病人，治愈10例，好转50例，无效者10例。

潘某，男，52岁。哮喘反复发作二十余年，多方治疗未能根治，69年改用上药，气平症消，至今未曾复发。

## 支气管扩张

**方 1** 生半夏，白芨，蛤粉，野百合，南天竹，百合。

**用 法** 共研细末，压制一分重片，一天三次，每次五片。

**方 2** 白芨，麦冬，野百合，天冬，蛤粉，百部。

**用 法** 共研细末，压制一分重片，一天三次，每次五片。

## 大叶性肺炎

- 方 1 蒲公英一两至三两。  
用 法 水煎服。  
疗 效 曾治五例，其中一例二剂热退，三剂痊愈。
- 方 2 鱼腥草一两，白茅根一两，金银花五钱，连翘三钱。  
用 法 水煎服。

## 肺 脓 疡

- 方 1 鱼腥草二两。  
用 法 水煎服或鲜草捣烂取汁内服。  
疗 效 方某，女，2岁。右肺脓疡，病程已二个月，服本草药后第二天热退，第七天胸透复查，脓疡已消失。
- 附 注 鱼腥草不宜久煎。
- 方 2 山红花（风毛菊）根一两至二两。

**用法** 晒干切片，每日一剂。将药置碗内加黄酒四两左右，加盖后，放锅中隔水蒸药半小时，倾出头汁，再加黄酒蒸取二汁。宜晚上临睡时服头汁，次晨服二汁。

**疗效** 缪某，男，成人。68年得病，长期咳嗽，脓痰带血性，具恶臭。看医生多次，注射青、链霉素和“止血针”无效。曾去某医院透视，肺部已有空洞，后用山红花治疗，当晚即能安睡，咳嗽迅速减轻，痰血逐渐消失。共服药八剂而愈。

## 潰病瘍

**方 1** 兰香草一钱至二钱。

**用法** 代茶（或研粉吞）。

**疗效** 王某，男，32岁。胃痛一天，西药治疗效果不显，用此方后痛即止。

**方 2** 活血丹（连钱草）一两，鸡儿肠（马



兰根)五钱。

**用法** 水煎服。

**方 3** 乌药一钱，广木香一钱五分，川朴二钱，积壳二钱，青皮一钱，陈皮一钱，桃仁二钱，瓜蒌仁二钱，乌梅三钱，当归三钱，麻仁二钱，芍药二钱，苏梗一钱五分，甘草一钱五分，榕木根一两。

**用法** 水煎服。

**疗效** 朱某，男，13岁。心窝部疼痛反复发作已一年余。近四个月来反复呕吐不止。诊断为溃疡病伴幽门梗阻。本拟手术治疗，后经用此方第二天呕吐即止，共服十剂而愈。

**方 4** 蒲公英五钱，陈皮一钱，白术二钱，甘草一钱，香附子一钱，红木香三钱，焦神曲五钱。

**用法** 水煎服。

**附注** 治疗十二指肠球部溃疡止痛效果好。

## 潰瘍病出血

- 方 1 头花千金藤（白药子）二分。  
用法 研末吞服，每日二至四次，连服三天。  
附注 剂量过大会引起头晕，泛恶，呕吐。
- 方 2 华紫珠叶四两。  
用法 水煎服。
- 方 3 三七粉五分，白芨粉一钱，包心菜汁一两。  
用法 冲服。

## 胃神經痛

- 处方 山萘六分，肉桂三分。  
用法 痛时吞服二至三分。

## 风湿性关节炎

- 方 1 茅膏菜。  
用法 取茅膏菜的块根研细，将约绿豆大的

药粉放在胶布上贴于患处，经二至四小时后取下，发泡后刺破去水，纱布包扎。

方 2 稀荃草、臭梧桐等量。  
用 法 共研细末，水泛为丸如梧桐子大，用黄酒送服，一日三次，每次一钱五分。

## 高 血 压 病

处 方 黑芝麻五钱，何首乌一两，牛夕一两。  
用 法 水煎服。

## 急 性 肾 炎

方 1 白茅根二两，西瓜皮一两。  
用 法 水煎服。  
方 2 鲜益母草四两。  
用 法 水煎服，每日一剂，分四次服。

## 慢 性 肾 炎

方 1 平地木一两，白茅根五钱，带皮苓三

钱，猪苓三钱，泽泻三钱，苍术二钱，制川朴一钱五分，陈皮一钱五分，甘草一钱。

**用法** 水煎服。

**疗效** 杨某，女，21岁，全身浮肿，腰发冷，尿少，已有二月。尿检：红细胞0—1，白细胞3—7，透明管型0—1。经过一个多月治疗痊愈。小便常规检查阴性。

**方 2** 玉米须二两。

**用法** 水煎服。

## 急慢性尿路感染

**方 1** 地茹五钱至一两，金樱子根五钱至一两，篇蓄五钱，白茅根五钱，一支黄花五钱，石韦五钱，海金沙全草五钱，活血龙五钱。

**用法** 水煎服。

**附注** 体虚者加入太子参三钱，白术二钱。

腰痛加入川断三钱，狗脊三钱，女贞子三钱。

体温高者加入一见喜五钱，白花蛇舌草五钱。

方 2 蒲公英鲜全草二两，蒲公英一两。  
用 法 水煎服。

### 急性肾盂肾炎

处 方 海金沙五钱，白花蛇舌草五钱，凤尾草五钱，白茅根一两，车前草一两。

用 法 水煎服。

### 尿路结石

方 1 海金沙一两，金钱草二两，鸡内金一钱半，车前子三钱，女贞子五钱。

用 法 水煎服。

疗 效 治二例，一例12天，一例7天排出结石。

方 2 金钱草一两，海金沙五钱，滑石五钱，

车前草三钱，白茅根五钱。

用法 加水三碗煎成一碗，二次分服。

## 尿 潴 留

处方 蟋蟀三对。

用法 研末，开水吞服。

疗效 有一患者，因前列腺肥大而不能自动排尿，服后15分钟即能自动排尿。

## 血小板减少性紫癜

处方 槐花四钱，侧柏三钱，大枣一两。

用法 水煎服。

## 白血球减少

方 1 活血龙（虎杖）五钱至一两，鸡血藤五钱，丁香一钱，米仁一两。

用法 水煎服。

方 2 党参四钱，红花三钱，桃仁三钱，桂枝一钱，白芍二钱，鸡血藤四钱，赤

芍三钱，生甘草二钱。

**用法** 水煎服。

**方 3** 猫人参二两至四两，卫矛（用根、茎去叶）五钱至一两，活血龙一两至二两。

**用法** 水煎服。

## 癩 痢

**处 方** 丹参三斤。

**用 法** 丹参三斤加50%酒精浸泡15天，过滤内服，每日二次，每次5毫升。

**疗 效** 神经科应用多例，一般尚满意。有的病例用苯妥英钠不能控制的改用本药后得到控制。

## 甲状腺机能亢进

**处 方** 黄独三钱，夏枯草五钱。

**用 法** 水煎服。

**疗 效** 曾应用八例，多用作术前准备，效

佳。吴某，女，31岁。因发现颈部肿块，心跳，气急二年多而入院。治疗前全身浮肿，基础代谢率+53%，脉搏108次/分。经服甲基硫氧嘧啶发现全身皮疹而停药。改用本方后浮肿消失，自觉症状好转，脉搏76—80次/分，肿块缩小即施行手术治疗而愈。

## 失 眠

- 方 1 铁扫帚二两至四两。  
用 法 水煎服。
- 方 2 五味子二钱，夜交藤五钱，合欢皮三钱。  
用 法 水煎服。
- 附 注 服药时间宜头汁下午服，二汁在晚上临睡前半小时至一小时服下。



# 外 科

## 止 血

- 方 1** 榔榆根皮干膏一份，紫桂树根干膏一份，大血藤膏一份，生半夏1/4份。
- 用 法** 研细末外用。
- 方 2** 榔榆根皮，紫桂树根各等量。
- 用 法** 洗净晒干，碾粉，撒布伤口。
- 疗 效** 普某，男，成人。因电锯锯断右手拇指、食指、无名指开放性骨折。当时流血不止，用上药撒布于创面上，二分钟血止。
- 方 3** 榔榆根皮。
- 用 法** 中层根皮，晒干研粉，撒布出血创口。
- 疗 效** 治外伤出血五十多例，效果良好。  
马某，男，成人。因作胼胝切除术，刀口太深，出血不止，经用止血粉二

次，出血停止，一周后痊愈出院。

方 4 紫珠草干膏一份，松香 1/2 份，海螵蛸 1/2 份，旱莲草干膏一份。

用 法 共研细末外用。

## 烧 伤

方 1 地榆干膏一份，大黄油浸膏一份，一枝黄花干膏一份。

用 法 调成50%的油液或软膏外用。

方 2 桉树叶五份，地榆干膏一份，黄柏油浸膏一份。

用 法 制成50%的油液或软膏外用。

方 3 地榆根四两，菜油半斤，黄腊二两。

用 法 地榆切成小片，放入菜油内隔水蒸6—8小时，滤去药渣，加入黄腊冷却即成。将上油擦患部，每天二次。

疗 效 用于两例，平均10天治愈。杨某，女，成人，脸部Ⅱ度烫伤入院。先用1/5000新结尔灭擦二天未见好转，

反而肿胀加重，两眼睁不开，疼痛加剧，改上药二天，痊愈出院。

- 方 4** 地榆一两，三颗针五钱。
- 用 法** 将上药研粉加凡士林一斤十三两（900克）、加热融化混匀。外敷，每日一次。
- 疗 效** 薛××，男，成人，烫伤左前臂2/3，为Ⅰ—Ⅱ度，用上药，一周后基本痊愈。

## 断指再植

- 处 方** 红梅消(三叶泡)、连钱草、四季葱白(火煨)，各等量，白糖适量。
- 用 法** 治疗19例，接活10例。将断指重新缝上，用小竹条四根固定，即将上药捣敷。同时可内服紫花地丁五钱，蒲公英一两，金银花五钱，一枝黄花一两，野葡萄根五钱，野菊花五钱。

## 骨 折

方 1 藜芦根一份，牛夕一份，血余炭（中药）一份。

用 法 碾粉。药粉加白酒调匀敷患处。

效 疗 用于骨折 5 例，效果良好。

卢××，男，战士。跌伤左足，检查左小腿中三分之一肿胀、压痛，胫前隆起不能活动。X光检查：左胫骨中1/3斜形骨折，胫骨下端斜形骨折。入院后给予跟骨牵引外敷上药粉，小夹板固定，一月后X光照片骨痂形成，能下地活动。

方 2 藜芦根一寸。

用 法 爵碎后用黄酒送服，一日二次。在服药期间最好只吃糖粥。为了照顾病人饮食，可采取间断服药法，停药数天，再服一疗程。

方 3 藜芦根一份，生梔子一份，生半夏

- 1/10份，桉树叶一份，生草乌1/5份。
- 用法** 共研细末，用鸡蛋清和醋调敷患处。
- 方 4** 冬瓜根 2 两，骨碎补根 2 两，野葡萄根 2 两。
- 用法** 将上鲜药加白酒适量捣烂备用。先行复位，将药外敷患处，杉树皮小夹板固定，每天酒精浸湿一次，7 天换药一次。
- 疗效** 用于 3 例骨折，平均 1 5 天治愈。  
孙某，男，1 5 岁，外伤，经 X 线检查左胫骨上 1/3 横断骨折。用上药两周，后片示骨折端骨痂明显生长，骨折线消失，患肢活动正常，痊愈出院。
- 方 5** 土伏苓藤、叶，藜芦根，野棉桃皮，各等量。
- 用法** 取上药等量，研粉。加水调糊状。敷于患处。
- 疗效** 郭××，男，右肱骨 1/3 横断骨折，当即复位敷上药，1 2 天后拆去固定

绷带，患肢肿胀消失，肢体功能恢复正常。

## 跌打损伤

方 1 大血藤三两，虎杖一两，抱石莲五钱，青石蚕五钱，络石藤五钱，红木香三钱，锦鸡儿五钱，稀荃草一两。

用 法 水煎服。

疗 效 治疗二例均治愈。

方 2 茅膏菜（全草）、马蹄香根、四叶对根各等份。

用 法 共研细末，选择压痛最明显点，用此药少许（约4—5粒米重之量），均匀撒布后，即用胶布（或采用风湿伤痛膏更好）盖贴。24小时后除去，一周后可重复用。

疗 效 治六例陈旧性劳损和急性扭伤病人，四例有效。

赵某，男，38岁，肩背部酸痛6—7年，

曾经中西医久治无显效，经上药贴敷二次痊愈。

**附注** 敷贴局部皮肤可发焦起泡，给予适当保护即可。

**方 3 蒴藿。**  
**用法** 取鲜蒴藿全草适量，加食盐或烧酒少许捣烂外敷。或取根一钱研粉酒冲服。

**疗效** 曾治急性腰扭伤二例，1—2天即愈。

**方 4 红茴香根3—4钱，金毛狗脊一两。**  
**用法** 水煎服。

**疗效** 此方应用急慢性腰肌劳损47例，多数痊愈，部份好转。

**方 5 天胡妥（破铜钱）一把。**  
**用法** 取鲜上药适量捣烂外敷。

## 破 伤 风

方 1 红茎蓖麻叶一两。

用 法 水煎服，每天三次。

方 2 蝉蜕一两，天南星二钱，天麻二钱，  
全蝎七只，炒僵蚕七条。

用 法 水煎服。黄酒二两为引，服前先冲服  
硃砂粉五分。

## 抗 菌 消 炎

方 1 桉树叶

用 法 15%桉树叶液用于手术室浸手消毒，  
或30%桉树叶用于冲洗创口、清洁创  
口、外敷引流等。取桉树叶一斤半，  
加水十余斤，煎后过滤成十斤即为  
15%桉树叶液。

附 注 小叶的桉树叶比大叶的桉树叶效佳。

方 2 一枝黄花、蒲公英、地榆、油麻藤各  
等份。



- 用法** 水浸制成干膏，研粉备用。
- 内服**：每次服三分至六分，一日三次。
- 外用**：制成50%软膏，或粉剂外敷。
- 方 3** 一枝黄花、凤尾草、海金沙、天名精、鸭跖草各五钱（鲜各一两）。
- 用法** 水煎服一日二次。
- 疗效** 用上方对Ⅰ类创口预防感染有良好的效果，如颈淋巴清扫、骨科手术、截肢术、颌面外科手术等；对Ⅱ、Ⅲ类创口有良好的控制感染的作用，如感染创口、沾染创口的截肢术后感染（脓多）、疮疖、腹部手术、上颌窦柯氏手术、骨科开放性骨折等共治25例，效果相当于青、链霉素。
- 附 注** 部份病人服后有腹痛，大便次数增多，但1—2天后即消失。
- 方 4** 一枝黄花、白毛夏枯草、千里光、蒲公英、匍匐堇、金银花、疔疮草、沙氏鹿茸草、紫花地丁各五钱——一两。

**用法** 任选上药1—数种，水煎服，主治各种炎症疗效满意。

## 外用麻醉

**方 1** 川乌、草乌、生半夏、蔓陀罗子各等份。

**用法** 共研粗末，用95%酒精浸泡四周，过滤装瓶备用。按手术大小，用药棉浸药液涂手术部位，几秒钟后局部麻木即可手术。

**疗效** 运用于拔牙，脓肿切开排脓，割治，埋藏等手术数十例疗效满意。

**附注** 有毒忌内服。

**方 2** 生南星、生川乌、生草乌、生半夏、细辛各五钱，白酒一斤。

**用法** 将药浸入白酒内，一周后去药渣，滤出液中再投入樟脑五钱备用。外伤引起局部疼痛时，取出药液擦伤处，有止痛作用。

## 疔

- 方 1 疔疮草一两  
用 法 水煎服或加盐捣烂外敷。
- 方 2 紫花地丁、蒲公英、半边莲、筋骨草、  
匍伏堇、蛇莓、野菊嫩叶，各用鲜全  
草适量。  
用 法 任选数种捣烂外敷。
- 方 3 木芙蓉花、野菊花、金银花各等量。  
用 法 混合研细粉，用凡士林调成10%软膏  
外敷。也可单用芙蓉花调成10%软膏。
- 方 4 大青叶五钱。  
用 法 水煎内服，每日一剂，药渣用以外敷。

## 疔病（多发性疔肿）

- 用 法 千里光五钱——一两。  
用 处 水煎服或同时外洗。

## 脓 肿

方 1 内服：野葡萄根四两，紫花地丁、蒲公英、一枝黄花、大蓟根各一两。

外敷：野山药根、黄独各适量。

用 法 水煎内服每日一剂。外敷药捣烂每日一换。

疗 效 治30余例，疗效良好。用此方亦曾治兰尾炎一例疗效良好。

方 2 板兰根一两，金银花、紫花地丁、大青叶、蒲公英各五钱。

用 法 水煎服，适用于局部肿痛较重，伴有发热较高者。

方 3 桉树叶（新鲜的老叶）

用 法 研细末，用凡士林调成30%软膏，贴敷患处每日换一次。适用于脓疡的各个阶段，即初起红肿，或脓成未破，或已破溃。

方 4 蜈蚣。  
用 法 焙干研粉密封备用。  
将药粉撒于疮面；如有窦道、瘘管，  
可将药粉掺在纸捻上，插入后仍将纸  
捻取出，外敷贴红膏药或纱布。

## 乳 腺 炎

方 1 蒲公英二——四两。  
用 法 水煎服，每日一剂，药渣外敷。  
方 2 蒲公英鲜二两，紫花地丁、大青叶、  
金银花各五钱。  
用 法 水煎服。  
疗 效 张某，女，31岁，左乳房红肿热痛，  
发热已二天，白血球10900，中性86%  
经过服上药六天而愈。白血球4600，  
中性69%，体温由38.7°C降至37°C  
方 3 仙人掌二片。  
用 法 鲜品去刺捣碎，加入95%酒精适量，  
调匀外敷。

- 疗 效 曾应用100余例，均痊愈。
- 方 4 王不留行、蒲公英、麦冬、瞿麦各三钱。
- 用 法 水煎服，每日一剂连服三天。
- 疗 效 治乳腺炎（产后乳胀痛）较好。
- 方 5 鹿角粉三钱。
- 用 法 黄酒冲服，每日一次或分二次服。连服三天。
- 疗 效 产后消散乳房肿块，尤其对产后初次乳胀有肿块者效果更为良好。

## 下 肢 潰 瘍

- 方 1 鲜蒲公英25%，鲜野菊花（或嫩叶）25%，豆腐渣50%
- 用 法 先将前二药捣烂，后加入豆腐渣捣匀外敷，每日换一次。
- 方 2 苦参根适量。
- 用 法 煎汤外洗。

## 骨 髓 炎

方 1 三叶翻白草根四钱，大蓟根三钱，七叶一支花一钱。

用 法 上药用酒燉服。一般三个疗程即可，十天为一个疗程。同时再外敷药如下：  
第一疗程：半边莲、榆树根皮捣敷。  
第二疗程：榆树根皮或三叶翻白草捣敷。

第三疗程：算盘子叶或其根皮捣敷。  
同时内服可改用七叶一枝花、算盘子叶或三叶翻白草水煎服。疮口生长正常以后单用大蓟亦可。

方 2 日本绣线菊叶

用 法 将鲜叶捣烂（或干叶粉少许），加烧酒敷于瘻管口，胶布固定，每二日换药一次。

疗 效 曾治愈慢性骨髓炎数例。

方 3 猫人参 一——二两，卫矛根或茎

三——五钱，紫威根一——三钱，银花三——五钱，苦参三——五钱，白芷三钱，七叶一支花一钱（研吞），活血龙三——五钱。

发热：加龙胆草一——三钱，并加重银花、苦参剂量。

**用法** 水煎服，每日一剂。每次煎约一小时，先用武火后用文火煎。同时鲜白芨捣烂外敷，每日换一次。

### 淋巴結結核

**方 1** 猫爪草二——四两。

**用法** 水煎服。头汁睡前温服，最好冲黄酒或红米甜酒二两至四两。二汁在次晨空腹服下，不必加酒。每日一剂，连服四天为一疗程，间隔三至五天继续服用。

**方 2** 夏枯草六钱，玄参三钱，象贝母四钱，牡蛎一两。

**用法** 水煎服。



## 急性兰尾炎

方 1 鲜红藤二两，鲜紫地丁一两，鲜败酱草五钱。

用法 水煎服，每日一剂，分四次服。

方 2 红藤、紫地丁各一两，丹皮、乳香各三钱，大黄、粉甘草各二钱，银花、连翘各四钱。

用法 水煎服

疗效 曾治伍例效佳。本方亦可治兰尾脓肿

## 兰尾脓肿

方 1 银花、蒲公英、紫地丁、败酱草、马齿苋、制大黄各五钱。

用法 水煎服，每日一剂。

疗效 据治疗35例分析，经服药后，体温下降平均四天，白血球下降平均六天，包块消失平均为8.4天。

方 2 败酱草、银花、蒲公英、紫地丁各五

钱，一枝黄花一两，红木香二钱。

**用法** 水煎服，每日一剂。

## 胆道蛔虫病

**方 1** 槟榔一两，使君子五钱，枳壳、苦楝皮各三钱，广木香二钱。

**用法** 水煎服每日一剂。

**疗效** 曾治五例，效佳。

**方 2** 乌梅丸三钱（吞），使君子肉五钱，苦楝皮一两，广木香、枳壳、元明粉、白芍、延胡索各三钱，生大黄二钱，生甘草一钱半。

**用法** 水煎服，每日一剂。

**疗效** 三例治愈出院（服3—4剂）。

张某，女，38岁，右上腹部阵发性绞痛，恶心，服上药后解出大量蛔虫，连服三剂症状消失治愈出院。

**方 3** 乌梅丸三钱（吞），使君子肉、苦楝皮各五钱，广木香、枳壳、生山楂、黄

柏、茵陈、黄芩各三钱，槟榔、延胡索、银花、红花各二钱，生大黄二钱（后下），连翘五钱。

**用法** 水煎服，每日一剂。  
**疗效** 主治一例胆道蛔虫症伴发胰腺炎，服上药六剂而愈。

吴某，女，14岁，心窝部疼痛阵发性加剧二天，伴呕吐。检查心窝部压痛明显，白血球8400，中性84%，尿淀粉酶512单位，服上药后次日即进食稀饭。服六剂后痊愈出院。检查白血球5700，中性43%，尿淀粉酶64单位。

### 胆囊炎、胆石症

**方 1** 金钱草二两，茵陈一两，落得打、凤尾草各五钱，车前草、藿香、枳壳、龙胆草、郁金、广木香各三钱。

**用法** 水煎服，每日一剂。  
**疗效** 曾治三例，效果好。

吴某，女，42岁，发冷发热三个月，巩膜发黄二个月，服上方拾天后黄疸、发热等均明显好转，至消失而出院。

方 2 落得打二两，蒲公英一两，金钱草五钱，对座草五钱，川玉金二钱，川栋子三钱。

用 法 水煎服。试治泥沙型肝胆结石。

方 3 蒲公英、紫花地丁、夏枯草、金银花、金银花屯、野菊花、炒白芍、延胡索各三钱。

用 法 水煎服。

疗 效 曾治愈八例，获得较好的疗效。

方 4 蒲公英二钱，忍冬屯、延胡索、茵陈、南沙参、龙胆草各三钱，柴胡、白芍各二钱，生甘草一钱，枳实一钱半。

用 法 水煎服。

疗 效 梁某，男，47岁，右上腹部反复疼痛二月余，伴发冷发热，5—6年前曾有类似发作病史。入院时体检巩膜与皮

肤有黄染，体温 $37.5^{\circ}\text{C}$ ，腹软，右季肋下可触及 $6\times 6$ 厘米包块，囊性感，有压痛，肝肋下1.5厘米。超声波检查，可见胆囊平段6厘米并有高反射，肝功能正常。诊断为胆囊炎胆石症，胆道蛔虫症。入院当日服上述草药，一日一剂，当晚腹痛剧，给予酸醋半斤，服后呕吐，胆囊显著缩小，第三天疼痛减轻，胆囊缩小为 $3\times 3$ 厘米，轻度压痛，第四天体温正常。但仍有胃部灼热不适，食后饱胀，暖气，改用生地、玉金、厚朴、枳壳各二钱，小青皮、佛手皮、炒谷麦芽、香青蒿各三钱。先后住院治疗一周痊愈出院。

### 蛔虫性肠梗阻

处 方 菜油2—4两。  
用 法 顿服。

**疗 效** 三例服后梗阻解除，排出大量蛔虫而治愈。

何某，女，5岁，因呕吐不能进食，诊断为蛔虫性肠梗阻。即灌服菜油二大两，6小时后内服15%驱蛔灵糖浆10毫升，12小时后再灌入菜油二大两，解出蛔虫200多条。痊愈出院。

潘某，男，53岁，因胃癌施行胃空肠吻合术后，腹部出现阵发性疼痛，经胃管灌入菜油4大两，症状缓解，解出大量蛔虫，梗阻解除。

### 急性胰腺炎

**处 方** 白花蛇舌草、金钱草各一两，紫背天葵、海金沙、生山栀、一枝黄花、荷包草各五钱，紫丹参四钱，凤尾草、延胡索、神曲、生大黄各三钱，藿香、制川朴各二钱。

**用 法** 水煎服，每日一剂。

**疗 效** 俞某，服上药后热退，自觉症状消失。

## 肠 粘 连

**处 方** 金樱子根三两，平地木一两，夜交藤三钱，一枝黄花一两。

**用 法** 水煎服，每日一剂。

## 痔 疮

**方 1** 无花果叶、功劳子各一两，金刚刺根五钱，漆姑草（或铁苋菜）三钱，野苕麻根六钱，鱼腥草四钱，蜗牛（带壳）或水蛭2—3只。

**用 法** 痔疮发作时取上药煎汤，趁热熏洗，每天二次。二天后取蜗牛2—3只捣烂后敷于患处，如无蜗牛用水蛭烧焦后研粉，用麻油或菜油调敷患处。

**疗 效** 本方对痔疮有显著应效，对于一般痔疮且能达到根治。

**方 2** 一枝黄花五钱，穿心莲三钱，蒲公英

五钱，车前草三钱。

**用法** 水煎服。

**疗效** 治痔切除术后肛门肿痛坠胀，局部浸润硬结者七例，各服3—5剂，患者自觉症状减轻，局部渐趋消退。

**方 3** 车前子三钱，忍冬藤三钱，蒲公英三钱，木通二钱，决明子四钱，甘草一钱。

**用法** 水煎服。

**疗效** 治痔核切除术后排尿不畅，肛门胀坠者2例，各服3剂后患者排尿通畅，胀坠好转。

**方 4** 沙氏鹿茸草五钱，紫花地丁五钱，鱼腥草四钱，墨旱莲四钱，何首乌三钱，夏枯草五钱。

**用法** 水煎服。

**疗效** 治痔核切除术后肛门炎症水肿者3例，各服3剂后局部炎症水肿消退，患者自觉胀痛减轻。



## 肺 癌

**处 方** 1方：西羊叶一两，生锦纹八钱，火麻仁八钱，江枳壳一两，全括萎六钱，元明粉四钱。

2方：炙冬花四钱，括萎仁六钱，炙桑皮四钱，冬瓜仁六钱，京川贝一钱，北杏仁三钱，桔红三钱，炙枇杷叶一两，莱菔子六钱，牛蒡子三钱，紫苏子三钱，茅草根一两。

3方：羚羊角二钱。

4方：鲜茅草根，萝卜子，白芨，桔皮，天花粉。（介绍者未注明剂量）

**用 法** 水煎服。

**疗 效** 郑某，男，48岁，四年前在杭州肿瘤医院胸片诊断为肺癌（晚期），未作治疗，返回家乡后服上述中草药，先服1方一剂，患者大小便通，气急减轻。继服2方二剂后，痰量减少，血

脓痰消失，胸部有热感。后给服3方（煎二小时），连服三天，胸部即无热感。以后连续服4方。服中草药后不到二年就能参加劳动，迄今未间断，2—3年前去医院复查已无病变，最近胸透复查，肺部正常。

## 乳 癌

**处 方** 1方：四叶对，七叶一支花，白藤梨，大红粉（用结晶），八角金盘，三叶青适量。

2方：半枝莲、白藤梨根、棉花根、黄堇、水杨梅根、岩条子各五钱，岩珠、虎杖各四钱，金丝吊葫芦三钱，四叶对、三叶青各二钱。

**用 法** 1方外敷，2方内服。

**疗 效** 钟某，女，53岁，58年右侧乳房无痛性肿块逐渐增大，活检证实为乳腺癌，内服和外敷上药，治疗一年而愈。

## 肝 癌

**处 方** 大黄麤虫丸加四君子汤出入。  
**用 法** 水煎服。  
**疗 效** 金某,女,38岁,64年7月经超声波、同位素及肝活组织穿刺病理切片证实为原发性肝癌,服上述中药治疗,经一年左右恢复健康,参加工作。69年11月针对门静脉高压作脾切除,脾肾静脉吻合术,另再在肝脏上取活组织作病理切片,病理切片为早期肝硬化(证明原肝癌痊愈)。已参加全天工作五年。

## 胃 癌

**处 方** 屯梨根四两,野葡萄根一两,半支莲五钱,凤尾草五钱,水杨梅根三两,半边莲五钱,白茅根五钱。  
**用 法** 水煎服。

## 食道下端胃贛門部癌

- 处 方** 猫人参一—二两，蜒蚰30条，鲜夹心肉四两。
- 用 法** 水煮服，服汤及肉。
- 疗 效** 一例服上方后疼痛减轻，一般情况好转，继续服药观察中。

## 脑 肿 瘤

- 处 方** 金剪刀（毛茛科，铁丝莲属）。
- 用 法** 外敷头部相应的部位。一例脑肿瘤6×6厘米大，用1—1.5两金剪刀，食盐3—5钱，捣烂外敷24—32小时除去。
- 疗 效** 8例脑肿瘤有效，最近两例试治效果也好。

## 腹腔恶性肿瘤

- 处 方** 半支莲（并头草）。
- 用 法** 水煎代茶服。
- 疗 效** 肿瘤医院诊断的腹腔恶性肿瘤一例，服上药后肿瘤不发展，已生存数年。

## 绒毛膜上皮细胞癌 （及恶性葡萄胎）

- 处 方** 白毛夏枯草七分一一钱。
- 用 法** 将白毛夏枯草研成粉剂，每次服七分一一钱，日服三次，开水送服。或加水煎服。
- 疗 效** 二例服上药后在一段时间内尿妊娠试验转阴性，肺部转移灶有吸收好转现象。
- 有十余例服上药后降低了抗癌药物（西药）治疗的反应，使副作用减少，如食欲增加，腹泻停止，口腔溃疡好转，白血球下降不明显等。

## 各种癌症

- 方 1** 鲜大核桃树茎枝半斤，鸡蛋六只。
- 用 法** 加水煮，蛋白凝固后，敲碎蛋壳再煮约一小时，服蛋及汁每天服一剂，一日分数次服。如胃纳差则酌情将蛋及汁分2—3日服或按比率减少药及蛋量。
- 疗 效** 曾有结肠癌及胃癌转移的二病例试治后一般情况好转，胃纳明显增加，远期效果继续观察中。
- 方 2** 黄药子五钱，白花蛇舌草、半枝莲、蒲葵籽各一两。
- 用 法** 水煎服，一日二次，一个月为一疗程。

## 毒蛇咬伤

- 方 1** 鬼针草 2，野菊花 1，金银花 1，半边莲 2，青木香 1，木防己 1，甘草 2。
- 用 法** 按上药比例，制成浸膏，每次服20毫升，每4小时一次。首剂20毫升。

疗效 治愈100余例，治愈率97%左右。消肿较慢。

方 2 山海螺五钱，粉萆薢八钱，粉防己五钱，土黄柏二钱，紫珠草五钱。

用法 水煎服。每日一剂。

疗效 治愈200余例，治愈率96%左右。

### 闭塞性脉管炎

处方 丝棉木根四两，牛夕三钱

用法 水煎服，黄酒冲服。

疗效 此方应用3例，疗效显著。

### 湿 疹

处方 枫杨树叶适量

用法 水煎外洗

疗效 疗效良好。

## 荨麻疹（风疹块）

- 处 方 鲜青蒿二两，白酒四两。  
用 法 将鲜青蒿浸泡入酒中，浸出液擦患处，每日数次。

## 手 癬

- 处 方 鲜凤仙花或茎叶适量  
用 法 捣烂擦患处

## 体 癬

- 处 方 丁香、土槿皮、白凤仙花各五钱，70%酒精300毫升。  
用 法 上药浸入70%酒精中一周后，取浸出液擦患处，每日三次。

## 脓泡疮（又名黄水疮）

- 处 方 大黄、元明粉、青黛各二两，白矾一钱。  
用 法 研细末，以菜油调搽。



## 带状疱疹

- 处 方** 内服：金银花、海金砂、连翘、各四钱，  
青龙衣五钱，凌霄花、生甘草各二钱。  
外敷：天胡荽，75%酒精。
- 用 法** 除每日用水煎内服药外，并用外敷药。  
将天胡荽一两浸入75%酒精中，取浸  
出液外搽局部，或捣烂外敷。
- 疗 效** 上药外用及内服，治疗7例效佳。

## 白 癜 风

- 处 方** 白蒺藜
- 用 法** 去刺研细末水泛为丸。每日三次，每  
次三钱，白开水送服，儿童酌减。
- 疗 效** 试治11例全部治愈。
- 附 注** 孕妇忌服。

## 斑 秃

- 处 方** 骨碎补三钱，斑蝥五只，75%酒精  
100毫升。
- 用 法** 上药浸入酒精中10天，取液外搽。

# 妇 科

## 月 經 不 調

**处 方** 丹参一斤，茜草半斤。

**用 法** 晒干研末，每服三钱，陈酒送下，连服二月。

## 閉 經

**处 方** 鸡血藤三一五钱（鲜一一二两），加酒二两，红糖一两。

**用 法** 水煎服，酒、红糖为引，每天一剂，七天为一疗程。

**疗 效** 治愈率70—80%。

## 白 帶

**处 方** 枸杞子根一两至二两。

**用 法** 水煎去渣，取汁煮夹心肉吃（量不拘）。

**疗 效** 治疗数百例，均见效，初起者1—2次即愈。

## 盆腔炎、附件炎

**处 方** 千年健二钱，追地风二钱，川续断四钱，桑寄生四钱，川椒二钱，白芷二钱，艾叶半斤，川羌活二钱，川独活二钱，赤芍四钱，归尾四钱，防风四钱，乳香二钱，没药二钱，红花二钱，血竭二钱，透骨草半斤，五加皮四钱。

**用 法** 上药分成二包，一次用一包，蒸热（可在锅上或蒸笼内蒸热），敷于小腹部，待药香气消失后就拿掉，每包可用十五次左右。

**附 注** 切勿与食品放一起蒸。

## 宫 颈 糜 烂

**方 1** 地榆炭1.6两，磺胺噻唑粉八钱，煨明矾八钱。

**用法** 上药研细，混和均匀，用白芨胶浆调成糊状，涂于宫颈糜烂处，每日或隔日一次，十次为一疗程。

**疗效** 治愈率80%。

**方 2** 乳香三钱，蛇床子一钱四分，丹砂四分，没药三钱，钟乳石四钱，卤砂三分五，儿茶三钱，雄黄四钱四分，血竭二钱五分，章丹一两五钱，冰片三分五，麝香四分，白矾九两五钱。

**用法** 制成约三分重的药丸，每周1—2次，塞阴道内，每次8—12次为一疗程。

**疗效** 治愈率41.9%，有效率93.6%。对中度、重度糜烂效果较慢。

## 滴虫性阴道炎

**方 1** 苦参粉，葡萄糖，硼酸各等量。

**用法** 上药研细，混合均匀，将粉喷射于阴道内，每天一次，十天为一疗程。

**疗效** 尚好。

- 方 2 白萝卜。
- 用 法 白萝卜捣成泥，用纱布包成直径三厘米，长八至十厘米左右园柱状，阴道冲洗后，塞入阴道内，八至十次为一疗程。
- 疗 效 治疗阴道滴虫，效果尚好。

## 宫 外 孕

- 处 方 党参三钱，黄芪三钱，炒白芍三钱，藕节炭六钱，仙鹤草五钱，远志炭八分，茯神三钱，阿胶珠三钱，血余炭三钱，川断三钱，菟丝子三钱，藕节五个，炒丹皮二钱，艾草炭八分，乌贼骨三钱。
- 用 法 水煎服。必要时配以西药治疗。
- 效 果 治疗30余例，有效率70%多。
- 附 注 用药期间，仔细观察，如有活动性内出血，应改用手术治疗。

## 妊娠中毒症

- 处 方** 藜芦三钱，80%乙醇100毫升。
- 用 法** 以渗漉法制取，每日三次，每次10毫升。
- 疗 效** 对晚期妊娠中毒症，降低血压，疗效尚好。

## 催 产

- 处 方** 红苕菹麻嫩叶。
- 用 法** 捣烂，敷两足心。（可代替奎宁及催产素）

## 引 产

- 方 1** 北五味子12.8两，50%酒精1000毫升。
- 用 法** 以渗漉法制取，每次5—6毫升，每一小时服一次，连服三次。
- 疗 效** 妊娠晚期引产，加强子宫收缩，疗效尚

好，有微弱宫缩时用更好。

- 方 2 通草2—3寸。  
用 法 将通草搓紧，放试管内高压消毒后，  
塞宫颈，晚上塞，次日手术。  
附 注 应用于人工流产时，扩张宫颈口。

## 通 乳

- 方 1 鹿角粉三钱。  
用 法 冲黄酒吞服，一天1—2次，连服三天。  
疗 效 产后初次乳胀，有肿块用之效佳。  
方 2 羊乳二两，通草二钱，猪猪蹄一付。  
用 法 水煎服。

## 回 乳

- 方 1 皮硝12两。  
用 法 上药分成二包，用布包后，置于两乳  
房部，24—48小时，用1—2次。  
疗 效 经24—48小时乳胀减轻，1—2次即  
断乳。  
方 2 麦芽二两，枇杷叶四钱（去毛）。  
用 法 水煎服，一日一剂，连用三天。

# 儿 科

## 麻 疹

- 方 1 贯众。
- 用 法 将贯众制成粉剂。预防麻疹，六个月至三岁小孩，每次服五分。
- 方 2 紫草根一钱，生甘草五分。
- 用 法 预防麻疹，水煎服，每日一剂，连服三天。
- 方 3 浮萍三钱，芦根一尺长，香菜根五根。
- 用 法 麻疹不透，水煎服。

## 流行性腮腺炎

- 方 1 板兰根三钱。
- 用 法 水煎服。
- 方 2 板兰根六钱，金银花三钱，甘草二钱。
- 用 法 水煎服。



**方 3** 青龙衣（蛇蜕）二—三钱  
**用 法** 青龙衣拌在蛋中，油煎食蛋吃。  
**效 疗** 一般1—2次肿消热退，治疗30多例，疗效80%。

## 百 日 咳

**方 1** 鸡苦胆一个，白糖适量。  
**用 法** 用针刺破苦胆，挤出胆汁，加入适量白糖，每天服二—三次。一周岁以上，每天服一个。

**附 注** 可用鸭、猪、羊、牛苦胆代替鸡苦胆。

**方 2** 扛板归一两。  
**用 法** 上药洗净，微炒，加淡水酒和冰糖燉开当茶喝。每日一剂，连服4—6剂。

**疗 效** 一般二剂后，症状即减轻。治疗七例痊愈。

**方 3** 匍伏堇（鲜）一两，一枝黄花三钱，  
截叶铁扫帚（鲜）六钱，石胡荽一钱。  
**用 法** 水煎分三次服。

疗 效 治疗24例，治愈21例，好转3例。

方 4 匍伏堇（鲜）一两。

用 法 水煎服。

## 白 喉

处 方 土牛夕。

用 法 预防：土牛夕一斤加清水2000毫升，浸一夜后，用慢火煎至1000毫升，滤出其渣再加水800毫升，用慢火煎至660毫升，然后将二次煎液混合，加入尼泊金4克防腐。每服10毫升，每日三次，连服四天。

治疗：鲜根1—2岁每日2—3两，5—8岁3—4两，水煎分四次服，连服数天。

## 小儿肺炎

方 1 三叶青八分，茜草八分，杏香兔耳风一钱，马蹄金八分，白英八分，加银

器一具，糯米适量。

**用法** 水煎服。  
**疗效** 治疗40例，治愈37例，无效3例。

病例：患儿王××，女，三岁，方溪公社方溪大队人，发热咳嗽，气急鼻煽，精神萎靡，给予上方煎服，一剂即愈。

**方 2** 阴地厥五钱，白英五钱，沙氏鹿茸草五钱，筋骨草一两，钩藤根一两。

**用法** 水煎服，每日一剂，分二次服。

**疗效** 治疗46例，均治愈。

## 小儿口腔炎

**方 1** 珍珠菜一把

**用法** 煎服。另取根捣汁洗口腔，一日数次。

**方 2** 沙氏鹿茸草三钱，一枝黄花三钱，并头草三钱。

**用法** 水煎服。

**疗效** 治疗鹅口疮40例，均治愈。

## 小儿惊风

**处 方** 单叶铁线莲一钱，三叶青一钱，阴地厥一钱，鬼箭羽（卫矛）一钱。

**用 法** 水煎服。每日一剂。

**疗 效** 病例，患儿周××，男，三岁，丽水太平公社人，1962年，全身抽搐反复发作二月余，直至每天抽搐1—2次，曾到双溪卫生院治疗10余天无效，后服上药三剂痊愈。

## 小儿消化不良

**方 1** 墨旱莲五钱，合萌五钱，马兰头五钱，白玉簪花一钱，山楂五钱，猪肝一两。

**用 法** 将以上中草药焙干研末，用竹片将猪肝对中剖开，将上药二钱纳入猪肝内，用笋壳包裹，放入火内煨熟吃，每日一次，连服3—5日

**疗 效** 治100余例，疗效显著。

方 2 菟丝子藤五分，厚朴 2—3 分。  
用 法 研粉或水煎（加五倍量的水）口服，  
每日三次。  
疗 效 治疗单纯性消化不良 257 例，疗效显著。

### 小儿疝气

处 方 酢浆草根五钱，小茴香根五钱。  
用 法 水煎服。  
疗 效 治疗 50 例，疗效达 90% 以上。

# 五官科

## 麦粒肿

- 方 1 紫花地丁五钱，穿心莲三钱。  
用 法 水煎服。  
疗 效 治数十例，比用青、链霉素疗效好。
- 方 2 青龙衣用75%酒精泡五分钟。  
用 法 外敷患处。加耳尖放血。

## 结膜炎

- 方 1 中华常春藤五钱至一两。  
用 法 水煎服。  
疗 效 治疗100例，均愈。
- 方 2 野菊花、龙胆草、金银花藤各三钱。  
用 法 水煎服。

## 角 膜 炎

处 方 苦爹菜根二钱，威灵仙二钱，毛茛一钱，六月雪一两。

用 法 水煎服。

## 角 膜 潰 瘍

处 方 蛇莓根三至五株，洗净捣烂，加入菜油一茶匙，每日蒸一次。

用 法 点眼，每日3—4次，每次2—3滴。  
每剂可连用5—7天。

## 玻 璃 体 混 浊

处 方 白根茅五钱，蒲公英一两，丹参五钱，穿心莲五钱，女贞子五钱，谷精草一两。

用 法 水煎服。

疗 效 治疗数例，均见效。

## 夜 盲

- 方 1 苍术五钱，胡萝卜五两。  
用 法 水煎服。
- 方 2 田皂角全草二两，加猪肝适量。  
用 法 水煎，吃猪肝和汤。
- 方 3 叶下珠全草一两，猪肝二至四两。  
用 法 水煎，吃猪肝和汤。

## 急慢性中耳炎

- 方 1 滴水珠晒干研粉。  
用 法 冲冷开水滴耳。每日2—3次。
- 方 2 金刚刺嫩叶、野菊花叶等量。  
用 法 捣烂绞汁，加烧酒数滴，每日滴耳三次。

## 耳鳴、听力减退

- 处 方 阔叶麦冬根半斤，肥肉四两。  
用 法 共煮，服汤和肉。



## 鼻炎、副鼻窦炎

- 方 1 鲜大蓟根三两，鸡蛋二至三个。  
用 法 共煮，吃蛋和汤。忌吃刺激性食物。  
疗 效 治疗200例，有效率达90%。  
方 2 苍耳子、辛夷、鹅不食草各三钱。  
用 法 水煎取浓汁，待凉后加入防腐剂作滴  
鼻剂，每日3—4次。

## 鼻 瘰 肉

- 处 方 乌梅肉炭、硼砂各三钱，轻粉、冰片  
各五分，共研细末。  
用 法 搽患处，或用香油调搽亦可。  
附 注 本方也适用于耳瘰肉。

## 扁 桃 体 炎

- 方 1 将木防己根在钵头底上加冷开水磨  
细。  
用 法 过滤后吃汁。

方 2 一枝黄花一两，沙氏鹿茸草一两。  
用 法 水煎服。  
疗 效 共治50例，其中治愈45例，5例好转。  
附 注 本方亦可用于治疗急、慢性咽炎。

### 慢性咽喉炎

处 方 一枝黄花一两，白英五钱。  
用 法 水煎服。  
疗 效 治数十例，无副作用，疗效较好。

### 蛙 牙 痛

处 方 细辛一钱，胡椒四钱，录豆六钱。  
用 法 研末搽患处。  
疗 效 共治60例，其中治愈45例，好转10例，  
无效5例。

### 神經性牙痛

处 方 摩来卷柏一至二两。  
用 法 水煎服。

## 附 录

### 一、中草药的制剂

人民要求普及，跟着也就要求提高。草药使用多采用直接煎煮的办法，我们如果将草药合理的做成各种剂型，就能更好地发挥其疗效，也有利于服用，贮存、运输和携带。

1、汤剂：将药物加适量的水，置药罐煎煮，去滓取汁称为汤剂，是最常用的一种剂型。汤剂比较容易吸收，发挥疗效较快，一般疾病均可应用，对新病和急性病更为适用。

汤剂制作时煎煮宜用瓦罐，取清洁的水，煎煮的时间和火力要随药物的不同而异。通常汤剂宜用微火慢慢煎煮，使药物中的有效物质较多地溶于水中。用水量大约为药物重量的6—7倍；用于解表药或攻下药煎汤的水宜少用，煎的时间宜短，使药力迅速；补养药水量宜多，煮的时间也宜长，使药力持久。

有些药物应根据本身的特性，加以特殊处理的，如矿物类药物应捣碎先煎；芳香药物如薄荷，紫苏等宜后入煎，以免气味失散。

汤剂宜冷后服或频服者称饮剂。用蒸馏方法制成的水剂称为露，如金银花露。汤剂供外用熏洗的称洗剂。

2、煎剂：煎剂与汤剂的制法基本相同，所不同者为煎剂去渣后，再用微火继续浓缩，一般对慢性病患者较宜。

3、散剂：将药物研制成粉末即为散剂，一般不宜加热或味太苦的药物都可制成散剂，散剂服用方便，吸收快，药效速，适于新病和急病，散剂有时也供外用。

4、丸剂：根据一定的处方，将药物研制成粉末，用蜜或水等作粘合剂，制成园球状的药剂称为丸剂。丸剂一般吸收较慢，因此药效发生也较慢，但持久，多适用于慢性病。

丸剂中用蜜调制的称蜜丸。先将药物拌匀，加炼蜜，药粉与蜜之比例为1：1或1：1.5

左右，混合均匀后，再搓条，制成大小不同的丸粒。一般每丸重一一二钱，最大为三钱。蜂蜜除有矫味作用外，还有补益的功效，多用于慢性虚弱疾病。米面糊调制的丸剂称为糊丸，糊丸干燥后质地坚硬，崩解度较慢，某些药物性质较烈制成糊丸可减少其对肠胃的刺激。用竹匾（象筛子）边喷水，边加粉，筛成需要的大小的丸粒，这种用水泛制成的丸剂称水丸亦称水泛丸。水丸一般都较小，便于吞服，且崩解度较快，药效发生也较快。用蜂蜡调制成的丸剂称蜡丸。蜡丸一般不易溶化，吸收较慢，毒性药物或贵重药物宜制成蜡丸。

5、膏剂分内服和外用两种，内服膏剂实际可说是汤剂浓缩使成粘稠状的物质，如羊乳（庐山党参）膏，膏剂有时还需加蜜使其变稠，并且有防腐作用，如益母膏，内服膏剂多用于慢性病或作为补剂。外用膏剂有外贴膏药和外敷药膏。膏药是用药物与植物油熬成，其方法是先将药料配好，装入缸内，加油浸泡5—7

天，油量一般是超过药料 2—3 横指，然后倒入铁锅内煎炸，到药料煎成炭状，再除去药渣，炼油，炼至“滴水成珠”，即油滴在水内成珠不散。然后加入黄丹，边加边搅拌，至丹全部溶化为止。离火稍凉加入樟脑、冰片等芳香药，最后把膏倒入凉水内，浸泡一昼夜以上去火毒，涂于纸、布或兽皮上，贴于患处。药膏是由药末加蜡和植物油调成，直接涂敷或涂纱布上敷患处。

6、丹剂：亦有内服外用二种，内服没有固定的剂型，外用则以药料混合制成极细末，或为化合物也叫做丹，如外科红升丹、白降丹等。

7、糖浆剂：适应于儿童服用。先制成单糖浆，取水 450 毫升煮沸，加蔗糖 850 克搅拌，待蔗糖溶解后，继续加热煮开，用脱脂棉过滤，加水至 1000 毫升，充分搅匀即得，然后将药料加水煮沸去渣浓缩（一般使每毫升含生药量一克），再将浓缩液和单糖浆按比例（一般

1 : 1 ) 配合即得。

8、酒剂：又称药酒，是将药物在白酒或黄酒中浸渍所得的浸出液，一般有冷浸法，即将药料浸入40—60度白酒中，加盖闭密，数日搅拌一次，浸一个月后即可使用。热浸法，将药浸入酒中，隔水加热至沸，然后将药倒入密闭大缸中，1—2周即可使用。因酒性善行，能宣通血脉，多用于风湿痹痛等症，如枫荷梨药酒、五加皮酒等。

9、胶剂：将动物皮、骨、角、甲等在水中久煎煮，使成透明或半透明的固体，是为胶剂，如阿胶、龟板胶等。胶剂多为补药。

10、片剂：将药糖磨成粉末，或将一部分药煎煮成浓缩液，和另一部分粉末混合，再用淀粉糊或其他糊合剂做成颗粒，压成片，土制压片机可以用木料或废铁自制。

11、注射剂：当前草药注射剂的生产在各级卫生防治部门都普遍开展起来了，大都采用水煎液经过过去除异性蛋白等手续制成。例如：

①接骨金粟兰（肿接风）注射液：全草切细，加4—5倍注射用水，煮沸15分钟，倾出煎液，残渣加水再煮一次，二液合并，减压浓缩至一定体积，加95%乙醇至含醇量为60%，放置过夜。次日过滤取液，再加乙醇至含醇量达75%，滤取液于水浴上减压收回乙醇后，放冷过滤，滤液按1：1稀释（即1毫升含1克），加0.2%活性炭脱色，煮沸5分钟，抽滤，滤液加精制氯化钠使含0.85%，安瓿灌封，以15磅30分钟灭菌。（针剂规格，可制成2毫升含2克或2毫升含4克）。肿接风注射剂，每天4次，每次2—4克，肌肉注射，连续2—3天，或更长时间。主治肺炎、阑尾炎、脓肿，预防手术后感染、急性胃肠炎等呼吸、消化系统的炎症疾患，其消炎、解热及舒筋活血的临床疗效确切，似可代替青霉素，无过敏反应及其他副作用。

②南岭莞花根皮（了哥王）注射液：了哥

王根皮  $\xrightarrow{\text{水浸煮}}$  浸煮液  $\xrightarrow{\text{浓缩}}$  粘稠物  $\xrightarrow{\text{95\%乙醇}}$



沉淀  $\xrightarrow{\text{过滤}}$  含醇滤液  $\xrightarrow{\text{收回乙醇}}$  粘稠液  $\xrightarrow{\text{水 适量}}$  水溶液

碱式醋酸铅  $\xrightarrow{\text{沉淀物}}$  沉淀物  $\xrightarrow{\text{置冰箱 冷藏}}$  上清液  $\xrightarrow{\text{通过阳离子 交换树脂}}$  交

换液  $\xrightarrow{\text{加氢氧化钠 调节PH}}$  换液  $\xrightarrow{\text{活性炭 过滤}}$  注射药液  $\xrightarrow{\text{按常规配制}}$  注射药液

灭菌  $\rightarrow$  灯检  $\rightarrow$  了哥王注射液成品（每2毫升含干了哥王根皮6克）。

了哥王注射剂，每次2毫升，每日1—2次，儿童酌减。对肺炎有显著疗效，对支气管炎，化脓性扁桃体炎，淋巴腺炎、咽喉炎也有很好的疗效。

（摘自江西药科学校革委会编《草药手册》）

## 二、注射用水

### 蒸馏法制注射用水

#### 1、装置：

蒸馏烧瓶（1000毫升），冷凝器，用高水位水桶装冷却水，用小炉子加热蒸馏。（见附图）


#### 2、制法：

取井水装入烧瓶中（不超过容积的一半），加高锰酸钾少许（至紫色不褪为止，一般常水1000毫升加N/10高锰酸钾10毫升）进行蒸馏，开始得到的初馏液（约1/10弃去，吸取中间的8/10蒸馏水供用。

#### 8、说明：

（1）按此制法，尚可考虑应用小铝锅、土冷凝器来制备。在收集蒸馏水时，应注意不受污染。

（2）初馏液因随同可溶性气体一起出来，故应弃去不用。



蒸馏法制注射用水装置图

(3) 共溶解青、链霉素约150支，未发生异常现象。

### 用离子交换树脂精制水

#### 1、材料：

(1) 离子交换树脂：系国产732苯乙烯型强酸性阳离子交换树脂1×7（交换当量4.5毫克当量/克）。国产717苯乙烯型强碱性阴离子交换树脂（交换当量3毫克当量/克）。

(2) 树脂配合比例：1：2，即阳树脂1公斤，阴树脂2公斤。


#### 2、装置：

用两个2.5立升的玻璃瓶（或用其他瓶代替）塞两个胶塞，胶塞打两个孔，插入一长一短的玻璃管，管端扎上二层纱布，用胶皮管联接即可（见附图）。

#### 3、树脂处理：

(1) 新树脂分别用常水浸泡过夜，使充分膨胀，然后沥净常水。

(2) 阴树脂：将沥净常水的阴树脂加



用离子交换树脂精制水装置图

8% HCl (工业用) 浸泡半小时, 如此反复三次, 以洗除杂质。再用常水将酸洗净 (至 PH 为 5 左右), 将水沥净。再加 8—10% NaOH (工业用) 转型, 使成一 OH 型, 所加碱液以没过树脂为度。如此反复至少浸泡三次, 每次半小时。因为阴树脂较难处理, 必要时可多浸几次。然后用常水洗去碱液, 至 PH 9—10 为止。

(3) 阳树脂: 处理方法同上, 不过先用 8—10% NaOH 洗除杂质, 再用 8% HCl 转型。

#### 4、树脂的混合与安装:

将分别处理好的树脂, 稍含一点水, 充分混合均匀, 装入两个交换瓶中, 装量应平均。再添加可量的水, 使树脂能流动, 插入带塞的玻璃导管, 塞紧并塞, 轻轻将交换瓶倒置、固定, 按装置图接好胶管。

#### 5、制水:

(1) 排除交换瓶中之空气:

其目的是为了**使树脂填充得均匀**，使水与树脂充分接触，充分交换。方法是将常水入口胶管先与出水管联接（即与制水相反的方向联接），使常水自第二交换瓶的短管进入，将空气慢慢自下往上驱出到第一交换瓶中。同样，将第一交换瓶中的空气驱出后，即可将常水接回第一交换瓶的长管上，进入常水，开始制水。

### （2）水的质量控制：

如果树脂处理得好，装置合适，除以少量水（1000—2000毫升）冲洗管道外，即可制得合格的水。

水的质量可通过PH和氯离子的检查来控制。

#### PH检查：

①取检品10毫升加甲红指示液2滴，不得显红色。

②取检品10毫升加溴麝香草酚兰指示液5滴，不得显兰色。

合格的PH大约在5.0—7.0，药房可用广

范围 P H 试纸代用上两指示液。

氯离子检查：

取检品10毫升加硝酸1滴，硝酸银试液4滴，不得发生浑浊。

当用新树脂第一次试制时，应按药典注射用水质量规定，作全面的、化学的、特别是热原的检查。

当水中出现明显的氯离子时，即表示树脂已交换饱和或老化，这时，即应将树脂重新活化。

6、树脂的活化（或再生）：

（1）树脂的分离：

将树脂全部倾出，沥净水份，加入25%食盐水，即可使阴树脂分离上浮，可用“淘小米”法将两树脂完全分离，沥净盐水，分别用常水洗净盐水，至无咸味，然后分别进行活化。

（2）活化：

阴树脂用 8—10% NaOH（工业用）

阳树脂用 8% HCl（工业用）



处理方法同上“转型”，然后重新混合安装，完毕后又可开始第二次制水，如此反复，可不断制水。

### 7、树脂的补充及其他处理：

(1) 树脂在反复使用过程中难免有损失，所以应及时补充。

(2) 当树脂反复应用，特别是阴树脂表面色泽变深，这说明树脂表面吸附着一些难以除去的有机杂质，这就不能保证有机物，特别是热原的吸附除去，这时应用70—80%乙醇，并酌加氯化钠浸泡12—24小时，以洗除所吸附的有机杂质。

(3) 当树脂被微生物污染（长霉）时，可用0.25%甲醛溶液浸泡4—5小时，然后用水洗净。

### 8、水源及其处理

用离子交换树脂精制水，对水源应加选择，以免树脂受到污染。如水源采用地下水，特别是机井水，因有机杂质含量少，可直接利

用，但因无机物含量较多，树脂容易老化，产水量相对地要少一些。

若采用地上水(如河水)则无机物含量相对地要少一些，但易受污染，含有机杂质、浮游物要多一些，为了使树脂不受污染，应事先进行处理。

实践证明，河水经砂、炭过滤完全可以达到目的。

(1) 砂子的处理：取细砂用常水反复洗至上清液成无色澄明为止。

(2) 木炭的处理：取木炭研细除去粗大的和细粉，用中等炭末，放脸盆中用1% HCl煮沸半小时，然后用常水洗至PH与常水相等为止，干燥，用前活化。

(3) 砂炭过滤装置：先将粗砂装入底层；后加细砂为滤器的1/3左右，再以砂层、炭层依次填充，应注意每层要平整，以免砂炭混合不清，最上层再填加粗砂，即得。

9、说明：

我们用上述方法精制水，并制备了大量的各种输液和注射剂供临床应用，未发现有任何异常情况。

### 用煮沸水作肌肉注射用水

#### 1、制法：

取泉水放铝锅内煮开、放冷，用药棉过滤，分装，灭菌即得。

#### 2、用途与用法：

曾用以溶解青霉素、链霉素、苯巴比妥以及稀释盐酸普鲁卡因等注射液，作肌肉注射，每次用量未超过4毫升，经三个月的试用，未发现任何异常情况。

#### 3、说明：

(1) 泉水加热煮沸，能使可溶性气体除去，同时可使部分钙盐凝聚沉淀，但绝大部分的无机盐类均不能除去，故当配制或溶解与之有配伍禁忌的药品，如维生素丙、肾上腺素等易氧化药品，常水中所含的重金属离子，可促使加快氧化变质，故应慎用。

(2) 泉水中所含无机盐，各地也有差别，我们仅用了清原县南山城公社黑石头大队的泉水。

### 注射用水的容器

在农村可利用废旧青、链霉素小瓶作注射用水的容器，甚为经济方便。处理方法如下：

#### 1、去蜡：

(1) 将小瓶放小锅内加水煮沸，使蜡熔化漂去（即乘热将水弃去），再加水和洗衣粉共煮，乘热刷净瓶外的蜡。

(2) 将小瓶埋入80—90 °C的细砂中使蜡熔化除去。

(3) 用酒精灯将蜡烤掉。

2、启去铝盖：启盖前必须将瓶外的蜡除尽，否则易污染瓶内，不易洗除。

3、洗涤：将小瓶、胶盖加洗衣粉少许，加水共煮后乘热刷净小瓶内外，以不挂水珠为度，胶盖用力搓揉，必要时用刷子刷洗，然后用常水刷洗，再用注射用水冲洗三次，即可灌

装。

4、密封：短期用者可加胶盖后，纱布扎口，灭菌备用。若延长应用时间，灭菌后，去纱布用胶布封严。或用明胶封口。其方法如下：明胶20克，甘油5克，酚2克，水加到100毫升。将灭菌后的小瓶乘热蘸上述溶液使胶塞与瓶口封严，待稍干后再浸蘸一层甲醛溶液即可。

（摘自沈阳药学院革委会教育革命组编  
《中草药验方、制剂、栽培选编》）