

贈閱

仙遊縣中醫藥研究所

中醫藥秘方驗方匯編

第二輯



仙遊縣

迎生

中醫藥研究所

編印

15
2

前 言

中国医药学，是我国人民几千年来同疾病斗争的经验总结，它是一个伟大宝库，必须继续努力发掘，并加以提高。中医验方，则是中医方剂中的主要构成部份，为医工所掌握，散在民间，往往秘而不宣，以至失传，致许多宝贵经验，湮没不彰，甚受损失。

解放后由英明而伟大的中国共产党领导，颁布中医政策，号召全体医务人员，继承和发扬祖国医学遗产，大搞医学革命，中西医团结合作，合流，为创立我国新医药学派而奋斗。解放几年来，尤其是58年继续贯彻党的中医政策后，我县与各地一样遵循党的总路线认真执行中医政策，中医工作全面地取得很大成绩，如开展全民性献方、抹方运动，广大群众踴跃地响应党的号召，掀起献方、抹方高潮，做出显著成绩，内容丰富多采，为适应中医工作发展，积累经验，加以整理提高，本行特将这些验方，经过整理分类，次第选出刊行，本集为二集，为妇、幼和五官科计192方。

由於我们水平有限，难免错悞，请读者批评指正，以达到提高目的

一九六零年七月一日

FR38/33

目錄

婦

科

1	子	宮	下	垂	4方	-----	11
2	咽	喉	疾	飲	1方	-----	2
3	月	經	不	調	5方	----- 2	3
4	白			帶	8方	----- 3	4
5	血			崩	12方	----- 5	7
6	惡			阻	2方	-----	7
7	姤	娠	惡	冒	1方	-----	8
8	子			疔	2方	-----	8
9	胎			漏	1方	-----	9
10	胎	氣	冲	心	1方	-----	9
11	流			產	3方	----- 9	10
12	死	胎	不	下	2方	-----	10
13	難			產	1方	-----	11
14	胎	動	不	安	3方	-----	11
15	預	防	孕	眩暈	1方	-----	11
16	胎	衣	不	下	2方	-----	12
17	產	后	發	熱	1方	-----	12
18	產	后	証	仲	1方	-----	12
19	產	后	瘀	血	3方	-----	13
20	乳	汁	不	通	5方	----- 13	14
21	消			乳	1方	-----	14
22	乳	痛	乳	痕	4方	----- 15	18

兒科

23	百日咳	2方	18	20
24	嘔吐泄瀉	4方	20	21
25	志冒咳	1方		21
26	重胎子	2方	21	22
27	胎毒	2方		22
28	遺尿	1方		22
29	夜啼	3方		23
30	便血	1方		23
31	丹毒	5方	24	25
32	口瘡	1方		25
33	濕疹	1方		25
34	龜背	2方	25	26
35	痢疾	5方	26	28

五官科

36	耳病	11方	28	30
37	鼻病	11方	30	32
38	眼病	21方	33	38
39	牙齦	12方	38	41
40	唇舌	5方	41	42
41	咽喉	23方	42	48

婦 科

方一 子宮下垂

症狀：產後體虛、操勞過度，或因挑勞過重而引起，脈細小無力，頭暈腰酸。

處方：党參三錢 黃芪四錢 白朮 杜仲各二錢五分 當歸 川升麻 大汗 鬼絲子各二錢 陳皮 龍骨各一錢五分 五味子 炙草各一錢

用法：水煎服

麥科防保院 蔣如山

方二

處方：党參三錢 黃芪四錢 當歸 白朮各二錢 柴胡 川升麻 陳皮 炙草各一錢 枳殼三錢 生姜三片 大蒜三枚

用法：水煎連服三、四劑而愈。

西苑防保院 吳彰成

方三

處方：黃芪三錢 桔核 升麻各二錢 當歸二錢五分 白朮 陳皮各一錢五分 炙草七分 油桂五分

用法：水煎連服二、三劑即愈。

石馬防保院 劉瑞鏞

方四

處方：蓖麻子適量

用法：去殼和飯粒搗爛，將頭頂頭髮剪掉一些，

連塗兩夜晚而愈。

中藥研究所

咽喉痰飲哽塞不下

症狀：婦人因氣鬱胸悶，痰飲閉塞，自覺咽中如突齶哽噎者。

處方：半夏四錢 厚朴二錢 茯苓四錢 生姜三錢 蘇叶二錢

用法：水煎服（原如不閉）

麥新方保院董捷秀

月經不調

方一

症狀：婦人經閉數月，或年余不行，步履時痛。

處方：當歸 丹參各三錢 川芎 生地 酒白芍各二錢

用法：水二杯，米酒半杯煎服。

榜頭防保院張登如

方二

症狀：婦女經前三、五天腹痛難忍。

處方：丹皮 白芍 當歸各三錢 旋子 白芥子 香附 乙金各二錢 黃芩 紫胡各一錢五分 甘草一錢

用法：水煎連服二劑，經行痛止。

城關防保院魏秉于

方三

症狀：婦女經行時腹痛。

處方：淮山 石炭各二錢 當歸四錢 阿膠三錢

巴戟天一錢 白芍三錢 甘草八分

用法：水煎連服二、三劑。

全 上

方 四

症狀：婦女經行過多，且流連十數日不淨，致體力衰弱，脈遲緩。

處方：黨參五錢 酒白芍 茯苓 生地 阿膠

白朮 艾葉 棕炭各三錢 當歸 卷骨各五

錢 陳皮一錢五分 吳草二錢 側金一錢

用法：水煎連服三、四劑。

郊尾防保院孫金佐

白 帶

方 一

處方：生牡蛎五錢 金櫻肉三錢 淮山三錢 縮

砂仁二錢 黃柏一錢 滑石一錢五分 吳草

草八分

用法：水煎空心服

城關防保院魏承于

方 二

處方：(1) 白朮 山藥(炒) 車前子(鹽炒) 黨

參各二錢 酒芍 黑荆芥 柴胡各一錢五分

蒼朮(酒製)一錢 甘草一錢

(2) 白朮 杜仲 金櫻肉各二錢 牡蛎三

錢 麝骨一錢五分 砂仁一錢 木香五分
炒淮山三錢

用法：兩者水煎服，先服第一劑，後服第二劑。
麥斜 防保院 謝元水

方 三

處方：香蕨 鷄

用法：香蕨浸酒，同鷄炕服。

國莊防保院黃覽青

方 四

處方：白花蛾蠟豆頭(根)一兩

用法：同蒜肉炕，空心服。

城吳防保院陳庚火

方 五

處方：(1) 白朮 茯神 當歸 黨參 杏仁各二

錢 吳茱三錢 遠志一錢五分 吳草 木香

各一錢 龍眼干五枚 椿皮四錢

(2) 黨參三錢 茯苓 白朮各二錢 半夏

陳皮各一錢五分 吳草一錢 椿皮四錢 生

姜三片 大棗三枚

用法：水煎服：屬于血虛者用第一劑，屬于氣虛者用第二劑。

石馬防保院李菊花

方 六

處方：當歸 生地 酒芍 白朮 蓮子肉各三錢

白鵝冠花 椿皮 浮石 益智仁各二錢

扁豆花四錢 川芎一錢五分

用法：水煎服

郊尾防保院林金佑

血崩

方一

處方：烏梅干14粒（去核煨灰） 龍眼干12粒
用法：烏梅研為細末，龍眼干水煎泡末服之。

方二

處方：洋參七分 當歸 酒芍 參冬 阿膠各三錢
生地 龜骨各三錢 川芎 黑側柏各一錢
黃芪四錢

卷華防保院李芹璠

方三

處方：核桃肉伍枚（燒存性）
用法：研為末，空心用溫酒送下。

榜頭防保院陳元豹

方四

處方：熟地一兩 當歸三錢
黃芪 里姜 阿膠各二錢
用法：水煎服

因莊防保院黃麗青

麥斜防保院謝成相

方五

症狀：血崩不止，頭暈目眩。
處方：黨參三錢 黃芪 栢子仁各三錢 白朮
當歸 石炭肉 阿膠各二錢 艾叶 吳草
升麻 陳皮各一錢
用法：水煎服

榜頭防保院張登如

方 六

症狀：血崩日久不止，或突然崩量過多而不止，

處方：黑蒲黃 炒靈脂 酒芍 阿膠 玄胡各三錢
當歸 生地 黃芪各五錢 川芎二錢
洋參一錢五分

用法：水煎分二、三次服。

城關防保院李 煥

方 七

症狀：血崩不止，或經來三、五月發復停滯，血
漏不止，而胎欲墜者。

處方：當歸 酒芍 地榆 益母草 阿膠各二錢
生地三錢 洋參 黑胡各一錢 川芎一
錢五分

用法：水煎服

榜頭防保院郭 崇

方 八

處方：黨參 遠志 杏仁 當歸 熟地 杜仲各
二錢 白芍 黑地榆 黃芪各一錢五分 阿
膠三錢 吳萸一錢 艾叶八分 黃芩一錢

用法：水煎服

城關防保院林克其

方 九

處方：棕根四兩

用法：炆肉服

石馬防保院蔡瑞賢

方 十

處方：本木耳(乾)三錢

用法：焙干至黑色，研為末，泡酒服。

郊尾防保院 蔡進添

方 十一

處方：百草霜

用法：研為末，泡酒服

全 上

方 十二

處方：地榆一兩 側柏叶五錢 甘草二錢

用法：水煎服

園莊防保院 趙連春

惡 吐

方 一

症狀：體質虛弱，妊娠三、四月，中脘宿有停痰，得食即吐，四肢並有倦怠者。

處方：黨參 白朮 桔紅各二錢 當歸 竹茹各一錢五分 川樸 香附各一錢 砂仁 甘草各五分 生姜三片

用法：水煎服

麥斜防保院 謝元水

方 二

症狀：懷孕二、三月，心煩惡食，嘔吐不止。

處方：蘇叶三分 川連五分 黃芩一錢 竹茹一錢 伏龍肝三錢 金銀一錢 麥冬二錢

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

妊娠感冒

症狀：頭痛鼻塞，身體疲倦，初則惡寒發熱，繼則微寒壯熱，或但熱無寒，腰腹俱痛，口渴引飲，煩躁不寧。

處方：桑葉 玉竹 竹茹 生白芍 生淮山 各二錢
桔梗 黃苓 知母 各一錢五分 甘草 蘇葉 各一錢

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

子癇

方 一

症狀：妊娠患瘧疾，一日一發，或兩日一發，寒輕熱重，屬於偏熱者。

處方：當歸 生地 首烏 知母 黃苓 各二錢
生白芍 三錢 川芎 甘草 各一錢

用法：水煎服，寒熱並重者加艾葉一錢。

全 上

方 二

症狀：孕婦患瘧疾，症狀與一般瘧疾同，或並腹痛者。

處方：當歸 生白芍 各一錢五分 生地 二錢 川芎 艾葉 各八分 黃苓 一錢

用法：水煎服，如熱重或腹痛者，黃芩、白芍須多用，並以杜心土調新汲水貼臍上下各一，乾則易之。

榜頭防保院張央如

胎漏

症狀：婦人產胎漏血，少腹痛，或腰痛下血。

處方：阿膠 當歸 酒芍 生地各二錢 艾葉

黃芩各一錢五分 川芎一錢

用法：水煎服，如腰痛加杜仲二錢、大汗錢半。

度尾防保院吳鴻榮

胎氣沖心

症狀：妊娠胎氣沖心，喘急大汗，四肢厥冷。

取穴：獨取鶴頂一穴

用法：俟患者兩腳垂地，針刺三、四分，用抑制法。

榜頭防保院朱兆明

流產

方一

症狀：孕婦屢在四、五個月，有習慣性流產者。

處方：當歸四錢 酒芍 生地 阿膠 故紙 鬼

絲子各三錢 川芎 杜仲 大汗各二錢

用法：水煎服 須於未流產前一個月服三、五劑。

石馬防保院李菊花

方 二

處方：熟地四兩 當歸（頭印歸）三兩 黃芩
白朮 杜仲 大汗各二兩

用法：合為末，調蜜作丸，須在未流產前一、二
個月早晚各服三錢。

城關防保院李世雙

方 三

症狀：有習慣性小產，腹痛、腰痛，體弱無力，
血行不止，或有休克狀態者。

處方：黃芪八錢 當歸五錢 香附一錢

用法：水煎服

榜頭防保院施文裕

死胎不下

方 一

症狀：孕婦跌仆損傷，或急熱病胎死腹中不動。
繼而腹滿、面赤舌青，指甲黑，口中有臭氣。

處方：蒼朮三錢 厚樸二錢五分 陳皮二錢 甘
草五分 朴硝五錢

用法：水煎服

麥斜防保院章如山

方 二

症狀：死胎不下，並治胎衣不下。

處方：樸硝三、四錢

用法：調量便承熱服之即下。

國莊防保院黃覽青

難產

處方：血餘 川芎各三錢

用法：水酒各半煎服

省華防保院李芹瑤

胎動不安

方一

症狀：妊娠數月，胎動，腰腹疼痛。

處方：當歸 黃芩 生白朮各八錢 ~~每分~~ 白芍

三至五錢 杜仲 六汗各二錢 ~~共一錢~~

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

方二

處方：洋參五分 白朮 當歸 黃芩各二錢 酒

芍藥錢 紫蘇 川芎 香附 杜仲 六汗各

一錢五分 陳皮 砂仁各一錢 甘草六分

用法：水煎服，如見血加地榆一錢，生地二錢。

郊尾防保院林金佑

方三

處方：苧麻根一斤 糯米一鐘 蓮子肉一兩

用法：水煎連服一、二劑胎安，有血亦能止。

城關防保院陳瑞慶

預防孕婦眩暈

處方：生扁豆五錢 當歸 川芎 白芍各三錢

用法：同豬腳或豆腐炖服（七個月起每月服兩劑）

附註：此方預防孕婦在臨產期間，有惡眩暈者服之。
大濟防保院岳金瑛

胎衣不下

方一

處方：檄欖核 蘇木

用法：檄欖核燒存性，調酒炒，研為末，用蘇木煎湯，加些酒送下。

國社防保院黃覽壽

方二

處方：煨牡蛎一斤

用法：研為末，盛入洗淨之桶中，用熱水調勻。將產婦扶坐在桶上半小時，胎衣即自下。

賴店防保院傅世忠

產後發熱

處方：當歸一兩 川芎三錢 桃仁一錢 姜炭八分
兵草五分 荆芥二錢 麥冬二錢 益母草二錢
五味子一錢五分

用法：水煎服（惡寒發熱口渴，夾似痲疾）

麥斜防保院章如山

產後悸沖

症狀：產後出血過多，心煩跳動不寧。

處方：當歸 黨參 遠志 黃芪 陳皮各一錢五分
分 杏仁 茯神 麥冬 白朮各二錢 川芎

八分 吳草五分
用法：水煎服

麥斜防保院謝元水

產後瘀血痛

方 一

處方：豬油一杯 韭菜汁一杯

用法：將豬油先熬，後把韭菜汁合勻，加米酒炖服。

園莊防保院黃覽青

方 二

處方：山楂肉三錢 烏糖三錢

用法：水煎服

老華防保院岳升煤

方 三

症狀：產後瘀血未下，發生血暈，甚至不省人事。

處方：五靈脂生熟各一錢五分 益母草二錢

用法：水煎，臨時取健康之童便調服。

附註：童便取時，以碗乘其中間一段用之。

榜頭防保院張央如

產後乳汁不通

方 一

處方：黃芪一兩 當歸五錢 白芷三錢 山甲二錢五分

用法：將藥炕豬蹄服

麥斜防保院董捷芳

方 二

處方：薦蓄一兩 白通草三錢

用法：炕猪脚服。

賴店防保院傅子博

方 三

處方：通草二錢 不留行三錢 山甲二錢 生地
三錢 黃豆五錢

用法：水煎服，或炕猪脚服。

附註：如惡露未盡不可服。

賴店防保院傅世忠

方 四

處方：當歸四錢 生地五錢 北杞 通草 不留
行各三錢 黃芪 川芎各四錢 洋參七分

用法：炕猪脚服。

郊尾防保院蔡瑞明

方 五

處方：山甲五錢

用法：研為末，泡米湯服。

同莊防保院黃覽青

消乳（

處方：麥芽一兩（炒黑）

用法：水煎服。

附註：俗稱斷乳

賴店防保院傅世忠

乳癰、乳疽

方一

症狀：初因外感，發生寒熱，繼引起乳痛紅腫。

處方：山甲 乳香 沒藥各一錢 皂刺 當歸尾
赤芍 銀花 陳皮各二錢 甘草 天花 防
風 白芷各一錢五分

用法：水煎服

麥斜防保院謝元水

方二

處方：甘草 天花 黃芩 梔子 牛旁各一錢
連翹 赤芍 當歸 柴胡各一錢五分 川芎
生地各二錢 蒲公英三錢

用法：水煎服

全上

方三

處方：丹皮 澤瀉 石炭各一錢五分 煨山 黃
芩 骨碎補各二錢 蒲公英四錢 生地三錢
乳香 沒藥各一錢

用法：水煎服

全上

方四

處方：銀花 蒲公英各三錢 當歸二錢 黃芪
錢五分 桔梗一錢

用法：水煎服，未出膿加白芷，寒熱加柴胡，服
已成倍加當歸、黃芪。

麥斜防保院謝成相

方五

症狀：惡寒發熱、身痛、乳房腫痛、尚未化膿者。

處方：生蒲公英一兩

用法：水酒各半炖服兩劑即愈。

麥斜防保院章如山

方六

處方：蒲公英五錢 姜實四錢 銀花 當歸各三錢 乳香 沒藥 青皮 甘草各一錢 浙貝二錢 白芷一錢五分

用法：水煎加酒少許服。外用鴨蹄香一兩搗爛炒酒塗患處。

方七

處方：當歸三錢 赤芍 浙貝各二錢 山甲 皂莢 黃芪 不留行各一錢五分 白芷一錢 甘草七分 蒲公英五錢

用法：水煎服

麥斜防保院林元椿

方八

處方：蒲公英 山甲 鹿角霜各三錢 川芎 雙安 連翹 梔子各二錢 當歸二錢五分
用法：水煎服。濕毒加猪苓、茯苓，痛甚加乳香、沒藥。

麥斜防保院林勇臣

方九

處方：蒲公英五錢 白芷五錢 川貝二錢

用法：水煎服

賴店防保院林朝瑛

方 十

症狀：乳頭破爛，痛又難忍。

處方：鹿角霜四分 甘草二分

用法：合為細末，用雞蛋黃（熟）一丁，加些菜油熬之，取油調末抹患處。

楓亭防保院張湖城

方 十一

症狀：婦女初產，乳頭被嬰兒吮破爛。

處方：煇甘石 梅片等分

用法：合為細末抹之

省華防保院吳壽年

方 十二

症狀：同上

處方：貝母 白芷各三錢

用法：合為末，每用開水送下五分，渣調酒敷患處即愈。

同莊防保院黃覽清

方 十三

症狀：乳房結一硬塊，皮色不紅亦不腫。又見疼痛，午後發熱。

處方：荆芥 防風各一錢五分 連苔 昆布 白芷
蘇黃芪 蒲公英 南藤各二錢 海藻 薑
甲各三錢 牛旁至 甘草 皂刺各一錢

用法：水煎服

城關防保院鄭文富

方 十 四

症狀：外吹乳痛

處方：韭菜 蚯蚓泥

用法：同搗如泥，調醋敷之即消。

國漢防保院黃覽青

兜 科

百 日 咳

方 一

症狀：咳聲連續不絕，喘而嘔吐者。

處方：胡桃三個 天冬三錢 冰糖一兩

用法：水煎泡雞蛋服

賴店防保院傅世忠

方 二

處方：天冬 麥冬各六錢 半夏 桔紅 茯苓

百部 瓜蒌仁各三錢 甘草 生薑各二

錢 生側柏叶 大棗各六錢

用法：水煎服 咽加竹茹 枳實各二錢，結合膜

充血加半膝三錢。上藥一劑分三日服，日服

三次。

縣中醫院施啓蕃

方 三

症狀：初起痰咳陣發

處方：竹茹三錢 百部一錢 冬瓜仁 連翹 銀

花各二錢

用法：水煎服，如有惡寒發熱加薄荷一錢

方四

症狀：久咳眼腫充血

處方：桑白二錢五分 地骨皮 桔梗 陳皮各一錢五分 石決明三錢 麥冬二錢 五味子 甘草各一錢

用法：水煎服，另用生地 烏豆用開水浸，將水煎服，其血自散。

麥斜防保院張登如

方五

症狀：痰咳日久不愈，痰液稠粘，甚至帶血。

處方：麥冬 元參各三錢 生白芍 生地 川貝母 丹皮 銀花 連苔各二錢 甘草 竹黃 薄荷各一錢

用法：水煎，量兒大小，分作數次服，每隔二至三時服一次。

榜頭防保院張登如

方六

症狀：咳至后期，體虛無熱，嘔吐不能食。

處方：百部 半夏 杏仁 川樸 桔梗各一錢 百合二錢 麥冬 淮山 茯苓 熟地各一錢五分 川連五分

用法：水煎服。

麥斜防保院林作楨

方七

症狀：咳至后期，痰中帶血。

處方：萬草根 麥冬 生地各二錢 生側柏四錢
 阿膠一錢五分 甘草一錢
 用法：水煎連服三劑

石馬防保院蔡瑞賢

嘔吐泄瀉

方一

症狀：小兒熱瀉嘔吐
 處方：阿膠一錢 猪苓一錢三分 澤瀉一錢五分
 茯苓一錢五分 滑石三錢
 用法：水煎服，如肚門紅加川連、黃芩各一錢五分
 石馬防保院

方二

症狀：吐瀉發熱、口渴唇紅、溺赤。
 處方：藿香 川連各七分 萬根 滑石 車前子
 各一錢四分 澤瀉 扁豆 麥芽各一錢 白
 朮八分 猪苓一錢 茯苓一錢五分
 用法：水煎服

榜頭防保院陳元豹

方三

症狀：慢驚脾虛泄瀉、嘔吐、四肢厥冷、脫水口渴。
 處方：虎參一錢五分 焦白朮一錢三分 茯苓一
 錢 木香 半夏各五分 炮薑 炮附子各三
 分 丁香四分 桂尖二分 天草三分
 用法：水煎服（小兒二、三歲量）

石馬防保院蔡瑞賢

方 四

症狀：久瀉成為慢脾症，嗜臥，消瘦，口渴，四肢厥冷，顛門凹陷。

處方：党參 當歸 羌活 故紙 杏仁(炒) 狗杞各二錢 其白朮三錢 熟地五錢 炙草一錢 石冬一錢五分 胡桃三錢(炒) 肉桂八分 炮姜一錢 生姜三片 紅棗三枚

用法：先用伏龍肝(灶心土)二兩煎湯，沉澱去穢湯煎藥煎，分二次服之。

麥斜防保院董捷芳

感冒咳嗽

症狀：感冒發熱，鼻塞咳嗽。

處方：桑葉二錢 薄荷 連翹 牛蒡各二錢五分
香豉 前胡 川貝 鉤藤 桔梗各一錢 甘草五分 蟬退三身

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

童子癆

方 一

症狀：不規則發熱，面色痿黃，肌肉逐漸消瘦，已成癆候。

處方：白脊蝦蟆16隻

用法：用鹽少許水炖服，連服三星期，服后如

有泄瀉，加龍眼干三枚，生薑二片。

石馬防保院蔡瑞賢

方 二

症狀：小兒骨蒸皮熱，几个月不退。

處方：洋參三分 鳳尾連三錢

用法：用開水調米糖炖服，連續服三劑。

全 上

胎 黃

方 一

症狀：初生嬰兒，周身發黃。

處方：生地一錢 茵陳一錢五分 赤芍 當歸

花粉 茯苓 澤瀉 白朮 豬苓各五錢

用法：水煎服

石馬防保院謝成相

方 二

症狀：初生嬰兒 發熱面赤，目閉囁喎。

處方：川芎 大黃 黃芩 黃柏各一錢 黑丑

滑石 連翹 赤芍各七分 薄荷 枳殼各五

分 檳榔七分 姜蘇二分

用法：合為細末，每用一錢，開水泡服。

石馬防保院黃捷芳

遺 尿

症狀：幼兒、老人夜晚遺尿，或日間有是病者。

處方：補骨脂五錢

用法：炒研为细末，淘水泡加此酒同服。

附註：此方对陽盛及肝腎有伏熱者忌用。

賴店防保院傳世忠

小兒夜啼

方一

處方：生地 木通 竹叶 甘草各一錢 蟬退三

三身

用法：水煎服。

石馬防保院蔡瑞賢

方二

處方：白芍 当归各一錢 白朮 柴胡 茯苓

丹皮各八分 黑梔子七分 薄荷四分 蟬退

三身

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

方三

處方：蟬退七 犀角 蘆薈 麝香各一分

用法：合为末，泡茶服，或抹乳頭服。

園莊防保院黃覽青

便血

症狀：初生儿七日内，小便下血。

處方：生地三錢 梔子二錢

用法：水煎服

麥斜防保院謝成相

丹毒

方一

症狀：先發毒，後發丹。

處方：連翹 瞿麥 連前子 牛旁子 梔子各一錢
黃芩 當歸各八分 滑石一錢二分 赤芍七分
柴胡六分 木通 防風各五分

用法：水煎服（一足量）

郊尾防保院蔡瑞明

方二

症狀：先發驚，後發丹。

處方：生地一錢二分 連翹一錢 元參一錢三分
木通 荆芥各五分 黃芩八分 竹叶六分
防風四分 甘草三分

用法：水煎服（一足量）

全上

方三

症狀：嬰兒百日內頭面胸背赤如丹砂，遊移上下，其熱如火，啼哭不休。

處方：升麻七分 防風八分 黑梔子 麥冬 荆芥
木通 葛根 薄荷 元參 牛旁子各一錢
甘草五分

用法：水煎服，如大便加大黃五分。

麥斜防保院章如山

方四

症狀：病从四肢起至腹，不久遍及全身，肢體灼熱，面赤。

處方：(1) 石燕 胆凡各一錢五分 硃砂 甘石
 沒藥 石蠟 黃栢各一錢 玄黃 石膏各
 三錢 川連七分 梅片五分 合為末
 (2) 玄黃 升麻 胭脂末各二錢 大黃三
 錢 葱白一把

用法：第二劑用水煎洗后，將第一劑藥末調枸杞
 汁塗于患處。

榜頭防保院郭 學

鴛口瘡

處方：滑石 甘草粉 梅片各三分 硃砂二錢
 硃砂 水石各一錢 柿霜四分

用法：合為細末，吹于口內。

城關公社陳庚火

濕疹

症狀：常生於面及耳之前后處，癢必要搔，皮膚
 破后，流出黃水，纏綿不愈。

處方：川連 黃栢各二分 煨石膏一錢五分

用法：合為細末，濕則將末搽于患處，乾則調開
 水抹之。

楓亭防保院張湖城

龜背

處方：松花 枳殼 前胡各六分 防風四分 獨
 活五分 麻黃三分 大黃七分 桂心三分

用法：水煎服

郊尾防保院蔡瑞明

龜胸

症狀：胸骨高如覆掌，唇紅面赤，咳嗽喘促。

處方：大黃一錢 杏仁一錢三分 木通五分 桑白八分 天冬一錢四分 石羔一錢五分 葶藶子一錢二分

用法：水煎服（一足份量）

全 上

疥毒

症狀：初生儿通身生疥，乾癢喜搔。

處方：苦參 生地 蕤薺各一錢五分 胡麻八分

用法：水煎服（一足份量）

全 上

痢疾

方一

症狀：痢疾初起

處方：當歸八分 川連一錢三分 槐角六分 枳殼七分 里芥五分 里栢叶一錢

用法：水煎服（一足份量）

全 上

方二

症狀：五色痢

方一：当归八分 赤茯苓一钱五分 赤芍七分
川连一钱二分 黄柏一钱 乾姜三分 蒲黄
胶七分 乌梅肉二枚

用法：水煎服（一足分量）

全 上

方三

症状：小儿休痢

方二：洋参三分 当归 卓前子 白朮各八分
川芎 神曲 白芍各六分 猪苓 泽泻 参
芽 石蓮肉各一钱 诃子 肉叩 陈皮各
分 川连一钱二分 茯苓一钱三分 乾姜三
分 木香五分

用法：合为末，蜂蜜作丸，一日分三次服，开水
送下，（一足分量）

全 上

方四

症状：潮热而又有血痢

方三：蒲黄胶 槐花各八分 地榆 秦皮 苍朮
各七分 白头翁 滑石各一钱五分 猪苓一
钱二分 藕节一钱四分 川连一钱三分 木
香五分 甘草三分

用法：水煎服（一足分量）

全 上

方五

症状：夏天水泻，兼有赤痢

方四：阿膠（蒲黄炒） 黑蒲黄各八分 猪苓一

錢二分 蒼朮七分 滑石一錢五分

用法：水煎服，如食積加黑山楂一錢，血痢不止加黑柏葉一錢。（一足半量）

全 上

五官科

耳病

方 一

症狀：中耳炎

處方：川連一錢 冰片五分 玄黃三分 煨白朮三分

用法：合為末 吹入耳中。

石馬隊保院蔡瑞賢

方 二

處方：煨白朮 山柰 白芷各五分

用法：合為細末，先用棉花籤蘸芭蕉汁洗淨，後吹入耳中。

賴店防保院傅世忠

方 三

處方：红柿寄生三兩（形似松柏鬚）

用法：煎酒服二、三次

賴店防保院傅子博

方 四

處方：胭脂末 玄黃各五分 抗凍膏 硃砂 水石 明礬各三分 冰片二分

用法：合為細末，吹入耳中。

方五

處方：甘石二錢 雄黃 胭脂末各一錢五分 梅片二分 明礬一錢

用法：先用棉花捻棉籤，將耳中流膿洗乾，後將藥末吹入耳中，如有炎腫疼痛，另用田螺一了，將尾截破，把液滴入耳中，炎痛即消矣。

度尾防保院林勉儒

方六

處方：蒼衣（即蒼絲）燒存性 冰片少許

用法：合為末，先將患耳洗淨，把末吹之。

中醫研究所林醒虛

方七

處方：手指甲（放新瓦上焙焦） 冰片少許

用法：合為末，同上法洗淨吹之。

同 上

方八

症狀：耳聾所語不清楚

處方：豬腸仔

用法：用葱加食鹽少許焗服之。

大濟防保院岳金麟

方九

症狀：耳花生在耳中，吐出如花狀，有時塞滿耳孔。

處方：苦參一錢（即鴉胆子）

用法：去殼用肉，搗細幼，調茶油塞入耳中。

度尾防保院陳步青

方十

症狀：小兒耳后破裂及痒（俗稱月无刈）

處方：地骨皮

用法：研末搽患處，未搽時，先用此藥粗末煎湯洗之，后搽此藥。

國莊防保院黃覽青

方十一

症狀：耳中生疔，痛不可忍。

處方：杜仲一錢 川連二錢 黃柏 黃苓 黑地
子各二錢

用法：水煎服，或加北杞二錢。

附註：外用三黃末加冰片、硼砂調藥油滴入耳中。

榜頭公社陳竹

鼻衄

方一

症狀：鼻血流不止

處方：鷓鴣干（雞菜干）二兩

用法：水煎調冰糖服，每次用一至二錢，服至十
余次而愈。

賴店防保院鄭少希

方二

處方：百草霜三錢 茅根 丹皮 梔子 当归各
三錢 生地三錢 黑柏叶 藕节 荷叶各一
錢五分 阿膠二錢

用法：水煎服一、二劑即愈。

麥斜防保院黃作舟

方三

症狀：勞動過度、肝火上炎，致衄血不止，面青唇白，如休克狀態。

處方：當歸 酒芍 柴胡 梔子 桑白 麥冬
阿膠各二錢 生地 茅根各三錢 白朮一錢
五分 藕節三錢 茯苓 丹皮各二錢 甘草一錢

用法：水煎服，外用厚紙燒煙尾心，血可即止。
榜頭防保院

方四

取穴：合谷 少商兩穴用針急刺

用法：強刺激

全上

方五

取穴：少商

用法：用艾燭如米大，流左灸右，流右灸左，如左右俱流，則左右俱灸三壯。

麥斜防保院韓文顯

方六

處方：天冬 生地 連翹各一錢五分 麥冬
葶子各二錢 黃芩 甘草各一錢

用法：水煎服

石馬防保院

方七

處方：龍骨

用法：研為細末，吹入鼻中即止。

國莊防保院黃覽青

處方：韭菜一匙
用法：搗碎塞在鼻內

麥斜防保院黃作舟

處方：白芨末少許
用法：調新汲水貼印堂即止

縣中醫院郭加華

症狀：口鼻流血不止。
處方：天花 白芷 赤芍 姜黃 各四錢 榆皮五錢

用法：研為細末，調酒製成一茶如世狀，圍在額上一周，鼻血即止。

賴店防保院陳積慶

症狀：鼻塞不通
處方：石川蒲 皂角等分
用法：合為末，用棉花蘸藥塞入鼻孔內自通

國莊防保院黃覽青

眼 病

方一

症狀：眼生白膜

處方：谷精珠二錢 川連 防風各一錢 綠矾
胆凡各三錢 小綉花針三枝

用法：藥研為末，用清水浸至花針化去為度，又
用新毛筆蘸藥水洗眼翳膜，即能消失。

賴店防保院傅子微

方二

症狀：眼瞶視物不明

處方：白蒺藜 川木賊 菊花 谷精各二錢 干
里光 不見春各三錢 北杞一錢五分

用法：同羊肝炆，飯後服。

城關公社陳慶火

方三

症狀：肝腎俱虛，發生內障。

處方：煅磁石六錢 大神柚一錢 枸杞 桑椹
沙苑 煅石燕 夜明砂 谷精各三錢 石參
一錢五分

用法：合為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，外用
珠砂為衣，每次服二錢，用開水送下。

城關防保院林克其

方四

症狀：眼內黑睛旁，生一小粒，又刺痛流淚和羞
明。

處方：桑白 地骨皮 麥冬 生地 黃卷各一錢
五分 桔梗 枳殼 旋子 防風 知母 杭
菊

菊花各一錢

用法：水煎服，連服三、四劑。

賴店防保院傅子微

方 五

症狀：夜盲，白天仍如常。

處方：煨石決明五錢 夜明沙三錢

用法：合為末，同羊肝或豬肝炆服

賴店防保院傅世忠

方 六

症狀：同上

處方：武夷仁三錢 草決明三錢

用法：合為末，調雞肝炆服。

琴斜防保院林馬臣

方 七

症狀：同上

處方：百草霜 煨石決明各三錢

用法：合為細末，用羊或豬肝煮熟，蘸藥末食下
兩次即愈。

縣中醫院施啓蕃

方 八

症狀：同上

處方：石忠 淮山 叶下珠（青草）各二錢 久
地三錢 丹皮 澤瀉 夜明沙各一錢 枸杞
一錢五分 夜萼二錢

用法：水煎服

方 九

症狀：同上

處方：生地 熟地 谷精 地骨皮 北杞各二錢
蒙花 鬼絲子 蒼朮各一錢五分 吳萸一
錢 白蒺藜 白菊花各一錢五分

用法：水煎服

育英黃院保防莊園

方 十

症狀：眼花視物不明

處方：鬼絲子 青箱子 黃柏 杜仲 菊花各一
錢五分 蒺藜 北杞 知母 千里光 茯苓
熟地各二錢 甘草一錢 洋參五分

用法：水煎服

同 上

方 十一

症狀：目昏，視物不明

處方：生地 杭菊花各三錢 淮山 滲瀉 茯苓
蒼耳子各一錢五分 石菖 萊菔 枸杞 谷
精珠各二錢 天麻 鹿角各一錢

用法：水煎服

火庚陳社公央城

方 十二

症狀：眼痛，又起白翳膜，視物不真

處方：真珠 琥珀 珊瑚 瑪瑙 香薷 藜蘆
各二分 川連 甘石各五分 珊瑚 馬蹄粉

各二錢 老片一錢

用法：合為細末，投融瓶中，用時取抹入眼中。

城關公社陳庚火

方 十三

症狀：眼紅赤痛

處方：豬膜 蒙茸

用法：同炕服，加鹽少許。

大梁濟保院張奎瑛

方 十四

症狀：同上

處方：柴胡 白芍 蒼朮 明礬 各一錢五分 黑抱子

胆草 木賊各一錢 木通 草薢子 菴苓各

八分 赤芍 澤瀉各一分 甘草五分 金蟬

退五斤

用法：水煎服

石馬防保院劉瑞鏞

方 十五

症狀：眼紅腫痛，或久而眼紋浮起青筋者。

處方：蛤粉 石決明 朴硝 谷精珠各三錢 夜

明砂二錢 真珠三分

用法：合為細末，用雞肝一具同炕服之。如久痛

眼內生翳膜，加木賊草二錢 蒺藜二錢 金

蟬八斤（藥成分兩次服）

務頭防保院

方 十六

方 十六

症狀：鷄仔目

處方：硼砂 玄黃 磁砂 紅丹各一錢 輕粉
一錢五分 麝香一分

用法：合為細末，吹入耳中，如患左眼，吹入
右耳；如患右眼，吹入左耳；雙眼俱患，
兩耳俱吹，連吹三、四次即愈。

南華防保院吳壽年

方 十七

症狀：目翳，黑睛上有膜，紅腫流淚刺痛。

處方：防風 生地 胆草 菊花 當歸各一錢
五分 木賊 荆芥各一錢 甘草五分

用法：水煎服

石馬防保院

方 十八

症狀：麥芒刺入眼中不能出

處方：橄欖

用法：將橄欖嚼碎，塗在眼上，麥芒自可引出。

國莊防保院黃覽齋

方 十九

症狀：慢性眼瞼炎

處方：胆矾二克

用法：胆矾燒至變色，加汽水30克外敷之。

郊尾防保院陳潮奇

方 二十

症狀：風眼，即通風流淚

— 38 —

取穴：太陽 睛明 合谷

用法：針刺 另內服：荊芥 菊花各三錢 水煎
郊尾防保院陳潮奇

方 二十一

症狀：兩眼紅腫痛，睛常流淚，小便不利大便結

處方：桑白皮 赤芍 元參 地骨皮 天花 大黃

川連 麥冬 芒硝 胆草 木通

用法：水煎服 重加羚羊五分

卷華高峰大隊吳升和

牙 病

方 一

症狀：初一齒腫痛，化膿後齒即脫落掉。

處方：蘆荅 胡連 元參 牛蒡子 銀柴胡

桔梗各一錢五分 石膏 梔子各二錢 大黃

一錢 竹叶三錢

用法：水煎服

石馬防保院吳玉申

方 二

症狀：牙疳出血

處方(1) 生地 久地 天冬 麥冬 知母 黃芩

各二錢 茵陳 枳殼 石膏各一錢五分 石

羔五錢 甘草一錢

(2) 五倍子(煨)一斤 銅青(煨) 硼砂 人

中白各三分 青黛 玄黃 梅片 硃砂各二

分

用法：1、水煎服 2、合为末，抹于患处。
賴店防保院陳積唐

方 三

症状：走馬牙痛、齿龈出血。

处方：淡竹叶 麥冬 元参 銀花各二錢 甘草
一錢

用法：水煎服

大濟防保院林如庆

方 四

症状：齿龈出血，觉有秽臭。

处方：白古月三粒 黑蒲黄 甘草 硃砂 青黛
青黛各三分 玄黄 樟脑各五分 兒茶四
分 米片一分

用法：合为末，先将口齿洗净后，乾擦之。

附註：药物如被嚥下，无妨碍。

中医药研究林醒廉

方 五

症状：牙床疼痛，有热象者。

处方：石膏三錢 生地三錢 元参二錢 細辛五
分 薄荷一錢 牛膝二錢

用法：水煎服（孕妇忌用）

榜頭防保院張央如

方 六

症状：牙关肿痛

处方：石膏四錢 知母 桔梗 枳子 黃柏 黃
芩各二錢 元参 射干各三錢 甘草 麥冬

各一錢 川連一錢五分 薄荷叶八分

用法：水煎服

榜頭公社陳竹

方 七

症狀：風火牙痛

處方：玉樞花根（生）一兩

用法：同豆腐炆服

楓亭防保院楊嘉瑞

方 八

症狀：牙齒疼痛

處方：1、當歸 丹皮 淮山 炙地各一錢五分

甘草 川連 川麻各七分

2、煨硼砂五分 冰片五厘

用法：1、水煎內服，如熱痛加黃芩 梔子各一

錢 2、合為末，抹于患處。

園莊防保院黃覽青

方 九

症狀：牙疔腫痛，不能開口。

處方：大黃 皂角 榆皮（少許）

用法：合為末，調米醋塗患（外）處。

榜頭防保院朱兆明

方 十

症狀：牙齒疼痛

處方：艾叶絨 生姜切片

用法：將艾叶捻成土團，放在生姜片上，對準穴
位上放下，艾絨用火燒至火滅為止。

先置肩髃上灸三壯後、再置合谷上灸三壯、其痛即止。如左牙痛，則灸右肩髃及合谷；右牙痛，則灸左肩髃及合谷；左右俱痛，則左右俱灸之。

榜頭防保院張登如

方 十一

症狀：有蛀齒，或无蛀齒，上下顎痛甚。

處方：生地 淡竹叶 細金銀各三錢 甘草一錢

五分

用法：水二碗煎、服

賴店防保院陳子微

唇舌病

方 一

症狀：舌根飲食困難，但麻木不痛。

處方：生蒲黃三錢

用法：研為末，患者用自巴食指洗淨后，把藥末放于舌面脹處，頻擦之，至脹退盡為止。

榜頭防保院王瑞祥

方 二

症狀：口唇生疔

處方：螺蛳草少許

用法：搗碎調烏糖塗患處

楓亭防保院楊嘉端

方 三

症狀：同上

處方：1、蟹 蛎 荊花叶 玄黃（適量）

2、荊花叶 玄黃

用法：以上兩方俱有效，可擇一方，搗塗患處。

石馬防保院劉瑞鏞

方 四

症狀：唇疔、鼻疔腫痛

處方：長尾虫（生在尿缸或陰濕溝處）山柰草

用法：烏鰂或蜂窠同搗塗患處

縣中醫院郭嘉學

方 五

症狀：唇疔腫痛

處方：白脊小蝦蟆

用法：將蝦蟆去腹肚塗患處即愈。

大濟防保院蔣元培

喉 病

方 一

症狀：咽喉腫痛，甚則內外皆腫，口多涎沫，

名纏喉風。

處方：犀角 梔子各一錢 生地 丹皮 川連

黃柏 黃芩各一錢 白芍 桔梗 麥冬

元參各三錢

用法：水煎服，內吹麝香散（詳見方七中）

榜頭公社陳竹

方 二

症狀：喉中微紅，發癢，不腫，有痛痺麻木，

吞嚥困難。係因火上炎，纏綿不愈。

處方：老片 半黃各二分 胆矾四分 山豆根二錢 硼砂一錢 玄黃一錢 兜茶一錢

用法：按梅運量，搗爛為丸，如龙眼粒大，臨臥時口含一丸，續用十粒，即可痊愈。

城關防保院陳瑞庭

方 三

症狀：單蛾腫痛

處方：五倍子一錢五分 冰片一分 牙皂 甘草 珠砂各五分 明礬 黃柏各三分 兜茶一分 玄黃二分 巴豆五厘

用法：合為細末，吹入喉中即消。

城關防保院郭文憲

方 四

症狀：咽喉腫塞，氣急，並腫及頸外，湯水難下。

處方：青射干 或青蛇冕

用法：可選擇一味用，如用射干，磨末醋取汁，抹于喉內，候痰吐盡即消。如用蛇冕，可搗汁灌下，吐痰即消。

同 上

方 五

症狀：咽喉乾燥，初起為紫色泡，久即漸破爛，飲食不下，音啞，名喉癆。

處方：石冬 丹皮 生地 桂梗 麥冬 元參 黃柏各二錢 淮山三錢 五味子 知母各五分 甘草一錢 茯苓一錢五分

用法：水煎服

榜头公社陳竹

方六

症状：慢喉風

處方：桔梗 射干 黃芩 黃柏各二錢 麥冬
元參各三錢 枳子一錢

用法：水煎服，內吹麝香散（方見下）

同 上

方七

處方：麝香散：川連 水石 辰砂 黃柏 珊瑚
各一錢 麝香 牛黃各五厘 川貝五分 真
珠一分 梅片二分

用法：合為細末，吹入喉中，一天四次，一切喉
痛症可用之。

同 上

方八

症状：咽喉腫痛

處方：珊瑚 珠砂 梅片 琥珀 甘石 青黛
薄荷 煨凍骨 元明粉各二分 川連三分
真珠一分

用法：合為細末，吹入喉內

城头公社陳庚火

方九

症状：同上

處方：梅片 琥珀 兜茶 珠砂各五分 珊瑚
玄明粉各六分 川連 雄黃各八分 牛

黄 珍珠各二分 薄荷末三分

用法：合为细末，吹入咽喉中。

省华公社陈清华

方 十

症状：咳嗽，咽喉红肿，吞嚥作痛。

处方：生橄榄十枚粒

用法：捣幼水煎服

榜頭防保院施文裕

方 十一

症状：咽喉发生白点，口液白色稠黏。

处方：生白芍六钱 麦冬六钱 元参八钱 生地八钱 丹皮 川贝各四钱 甘草二钱 薄荷叶一钱

用法：水煎服，小儿八岁以下减半。如大便不通加大黄二钱，芒硝四钱，胸中闷加麦冬二钱 志柏二钱，小便不通加知母 黄柏各二钱 木通二钱

度尾防保院陈金嘉

方 十二

症状：喉之外旁，发生形如圆眼，血系相繫，此係肺有鬱热，称为喉瘤。

处方：川连 黄柏各一钱五分 黄芩 桔梗 元参 麦冬 射干各二钱 枳子 甘草各一钱

用法：水煎服

榜頭公社陈行

方 十三

状：初起恶寒发热，口渴头痛，身体疲倦，喉

部紅腫，並起小粒如珠形。同時舌下也現一小舌，飲食難下，不能言語。（名喉珠重舌）

處方：1、五虎丹：辰砂二錢 煨礬砂一錢 甘草三分 牛黃一分 老片一錢 水石三分

2、玄黃 麩粉 赤石脂

3、田芥藍〈青草〉

用法：1、五虎丹合為末，先用針經消毒后，將喉部小珠刺破，再用開水漱口，吹入藥末。
2、玄黃等三味合為末，調米酒塗印重穴。
3、田芥藍搗幼調米醋含重舌處。

慶尾防保院余仕悅

方 十四

症狀：咽喉生有小出血点、現紫紅色，疼痛，有時發微熱。（名喉癩）

處方：五虎丹加菴澁 瑪瑙 麝香 石花

用法：合為細末，吹入喉中。

全 上

方 十五

症狀：面色痿白，喉內腫痛，外項亦腫大，頭暈腰痛，身上又發現斑疹，聲音嘶啞，呼吸困難，體倦麻木，內熱熾盛（名雙蛾）。

處方1、五虎丹加珊瑚 菴澁 為末。

2、黃柏 樸硝 赤石脂 玄黃 姜汁 麩粉 酒

用法：1、用刀先刺破患處，搨出惡血，開水漱口后，吹入藥末于咽內。

2、药合为末，调姜汁、酒、麩粉作如乾糊状。另用针消毒后，刺破斑疹，将药在疹上搓擦之。

同上

方 十六

症状：面色油红，口闭眼不合，角弓反张，眼睛直视，不能言语，病状垂危，此火毒攻心，

〈名吐瘴〉

处方：五虎丹（方见前）

用法：按上列方十三剂量，以二分之一分两次服下，留一半随时吹入喉中。

同上

方 十七

症状：咽喉被鱼骨鲠在喉中，不能下咽。

处方：煨珊瑚少许

用法：研为末，吹入喉内即下。或用橄榄核磨醋嚥下即消。

青勉院保防在园

方 十八

症状：同上

处方：山奈 砂仁 灵仙 草菓各同量

用法：共为末，调乌糖作丸，用布包浸米醋，俟患者口含一丸，至醋气无时，再换一丸，如此轮流含之，骨即可下。

附註：患者如口涎能吞下，者可救治。

城湖張院保防亭楓

方 十九

症狀：同上

處方：威靈仙四錢 山奈 珊瑚各一錢五分

用法：水煎調烏糖服下

賴店防保院林朝琨

方 二十

症狀：同上

處方：山奈一大片

用法：用口含之，津液可吞下，骨即自吐，或能吞下。

賴店防保院傅子博